

3) 耳介

妊娠の2-3ヶ月の時に6つの膨らみが頸の位置にできて、徐々に耳の形ができてきます。標準的な耳の形は縦横の比率が2:1と縦が長く、縦の長さは成人男性では65mm前後、成人女性では60mm程度とされています。

しかし、耳の形や大きさは人によりさまざまで、全く同じ顔の人がいないのと同様に全く同じ形耳の人もないと言っても過言ではありません。

乳児の耳介は可塑性があるため、歯の矯正と同様に耳介も矯正治療ができる事ははっきりしてきました。耳の矯正治療は本人が嫌がって外そうとする手の動きができるようになる前の生後3ヶ月以内が最も効果的です。



副耳とスタール耳変形



手術後1年



右耳前瘻孔



感染が疑われる右耳瘻孔

40-50人にひとりは見られる頻度の高い疾患で、瘻孔の深さに個人差があり、一生問題を起こさない人も多いが、瘻孔が深い人では中に粥状物がたまるため臭いにおいがしたり、感染を起こすため手術治療の適応となります。



折れ耳変形



手術後1年

見た目に目立つだけでなくマスクや眼鏡がかけにくい。



埋没耳変形



手術後1年

見た目に目立つだけでなくマスクや眼鏡がかけにくい。



耳垂裂



手術後1年



小耳症
耳の矯正治療

手術後2年



右埋没耳矯正前

矯正具装着

矯正後3ヶ月



右耳介低形成 矯正前

矯正具装着

矯正後3ヶ月