

<別表1>遮光・防湿 (2025年4月改訂)

外来・退院(3Mo)		入院(1Mo)
薬品名	対策	
ア行	アカルボース	乾燥剤
	アコファイド	乾燥剤
	アスペノン	遮光袋
	アゾセミド	遮光袋
	アブレゾリン	遮光袋
	アミオダロン	遮光袋
	アミサリン	乾燥剤
	アムロジピンOD	遮光袋 乾燥剤
	アルファロール散	遮光袋
	イムラン	遮光袋
	インデラル	遮光袋
	ウブトラビ	遮光袋
カ行	ウラリット-U配合散	乾燥剤
	塩化カリウム徐放錠	乾燥剤
	漢方薬	乾燥剤
	コルヒチン	遮光袋
サ行	コララン	遮光袋 乾燥剤
	シトルリン	乾燥剤
	シプロキサン	遮光袋 乾燥剤
	臭化カリウム	乾燥剤
	スマトリプタン	乾燥剤
	セパミット・セパミットR細粒	遮光袋
	セルセプト	遮光袋
	ゼルボラフ	遮光袋
	セレニカR顆粒	乾燥剤
	ゾスバタ	遮光袋
	ジルビデムOD	遮光袋
		×
タ行	ダイアート	遮光袋
	タケキヤブ	遮光袋
	ダラシン	遮光袋 乾燥剤
	デカドロン	遮光袋
ハ行	テノーミン	遮光袋 乾燥剤
	パファリン配合錠	乾燥剤
	バリキサ	乾燥剤
	ビタメジン	遮光袋 乾燥剤
	ピリドキサール	遮光袋 乾燥剤
	ヒルナミン	遮光袋
	フォシーガ	遮光袋 乾燥剤
	ブスコパン	乾燥剤
	ブフェニール顆粒	専用袋 乾燥剤
	ブラケニール	遮光袋 乾燥剤
	フラジール	遮光袋
	プレタールOD	乾燥剤
	プレディニンOD	乾燥剤
	プレマリン	乾燥剤
	フロセミド錠	遮光袋
	プロタノールS	遮光袋
	プロベラ	乾燥剤
ヤ行	プロムヘキシン	遮光袋 乾燥剤
	ベサノイド	遮光袋 乾燥剤
	ペルジピン	遮光袋
	ペルソムラ	遮光袋 乾燥剤
ラ行	ペンタサ顆粒	遮光袋 乾燥剤
	マドバー	遮光袋 乾燥剤
	ミカルディス	遮光袋
	メスチノン	遮光袋 乾燥剤
	メチコバール	遮光袋 乾燥剤
	メトレキサート錠2mg	遮光袋
ワ行	メラトペル	遮光袋
	メルカゾール錠	遮光袋 乾燥剤
	ユビデカレノン	遮光袋
ヲ行	ユベラ	遮光袋 乾燥剤
	ヨウ化カリウム	乾燥剤
	ラバリムス顆粒	遮光袋
	ラバリムス錠	遮光袋 乾燥剤
	リオナ	遮光袋
	リトドリン	遮光袋
	リネゾリド	遮光袋 乾燥剤
	リファジン	乾燥剤
	リボトリール錠	遮光袋
	リマプロスト	乾燥剤
	リンヴォック	遮光袋 乾燥剤
	ルネスタ	乾燥剤
ワ行	レズロック	乾燥剤
	レクチゾール	遮光袋
	ロゼレム	遮光袋
	ワソラン	遮光袋 乾燥剤
ワ行	ワーファリン錠	遮光袋
	ワルファリンK細粒	遮光袋

<別表2>説明書添付(2025年4月改訂)

	薬品名	外来・退院	入院	
内 服 薬	イーケプラDS	○		
	エビリファイ内用液	○		
	オセルタミビル	○	○	
	クラバモックスDS	○		
	クラリスロマイシンDS	○		
	ケイツーシロップ	○		
	コンサーダ	○		
	ジスロマック	○		
	スプリセル	-	-	初回のみ
	スマトリブタン	○		
	セレニカR顆粒	○		
	ネオーラル	○		
	バルプロ酸Na	○		
	ブイフェンド	-	-	初回のみ
外 用 薬	フルコナゾール	○	○	
	ヘマンジオルシロップ小児用	○	○	
	ラミクタール 冊子	-	-	初回のみ
	ラミクタール 用紙	○		
	アフタッチ	○	○	
	インテパンクリーム	○		
	ウリナスタチン	○		
	エストラーナテーブ	○		
	吸入薬	○	△	入院:ネプライザー薬液以外
	坐薬	○	△	入院:アンヒバ W6かつ麻酔科のみ添付
	瞼錠	○		
	ツロブテロールテーブ	○		
	デキサメタゾン口腔用軟膏	○	○	
	点鼻薬	○	○	
	プロトピック	○		
	フロリードゲル経口用	○		
	ヘパリン類似物質スプレー・ローション	○		
外 用 薬	点眼薬			全身への副作用に注意が必要なもの
	アイファガン	○		
	アトロピン	○		
	コソフト	○		
	サイプレジン	○		
	サンピロ	○		
	チモブトール	○		
	デュオトラバ	○		
	ネオシネジンコーワ	○		
	ミドリンM	○		
	ミドリンP	○		

<別表3>賦形しない薬剤(2025年4月改訂)

顆粒剤(サムスカ顆粒、 ラパリムス顆粒は除く)
抗生素(錠剤粉碎時は除く)
漢方薬
アスコルビン酸
アシクロビルDS
安息香酸ナトリウム
ウラリット-U配合散
塩化ナトリウム
オセルタミビルDS
オノンDS
ガランターゼ
シトルリン
ツロブテロールDS
ボセンタンDS
ランソプラゾール粉碎

<別表4> 専用分包機使用薬品

2025.4

薬品名	粉碎ハンドブック
アフィニートール錠	危険度Ⅱ
イムラン錠	危険度Ⅰ
エンドキサン錠	危険度Ⅰ
グリベック錠	危険度Ⅰ
サーティカン錠	危険度Ⅱ
ジャカビ錠	危険度Ⅰ
スプリセル錠	危険度Ⅰ
セルセプトカプセル	催奇形性
ゼルボラフ錠	危険度Ⅰ
ゾスパタ錠	危険度Ⅱ
タシグナカプセル	危険度Ⅱ
テモゾロミド錠	危険度Ⅰ
ネクサバール錠	危険度Ⅰ
ハイドレアカプセル	危険度Ⅰ
バリキサ錠	催奇形性・発がん性
プラケニル錠	*1(添付文書)
ベサノイドカプセル	危険度Ⅱ
ベプシドカプセル	危険度Ⅱ
メソトレキセート錠	危険度Ⅰ
メトレキサート錠	危険度Ⅰ
ラパリムス錠・顆粒	危険度Ⅱ
リウマトレックスカプセル	危険度Ⅰ
リンヴオック錠	催奇形性
レズロック錠	催奇形性
ロイケリン散	危険度Ⅰ

*1(添付文書)

【禁忌】6歳未満の幼児[4-アミノキノリン化合物の毒性作用に感受性が高い。]

<抗悪性腫瘍剤の院内取り扱い指針>

危険度Ⅰ: 毒薬指定、催奇形性または発がん性が報告されているもの、疑われるもの

危険度Ⅱ: 動物実験において催奇形性、胎児毒性または発がん性が報告されているもの、疑われるもの