

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（呼吸器センター）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2026 年 6 月 18 日

○ 更新内容

2026 年 6 月 18 日

【追加レジメン】

- ・ NSCLC>3W リフ[®]ロファス[®]+CBDCA/PEM(初回)
- ・ NSCLC>3W リフ[®]ロファス[®]+CBDCA/PEM(2-4Kr)
- ・ NSCLC>3W リフ[®]ロファス[®]+PEM(5Kr-)
- ・ NSCLC>4W リフ[®]ロファス[®]+ラス[®]クス-ス[®](初回)
- ・ NSCLC>2W リフ[®]ロファス[®]+ラス[®]クス-ス[®](2kr-)
- ・ NSCLC>3W リフ[®]タヨ+PTX/CBDCA
- ・ NSCLC>3W リフ[®]タヨ

2025 年 11 月 17 日

【追加レジメン】

- ・ NSCLC>3W ライフ[®]リハ[®]ント+CBDCA/PEM(BW<80kg)
- ・ SCLC>4W イムテ[®]トラ(1kr), SCLC>2W イムテ[®]トラ(2kr-)

【変更レジメン】

- ・ SCLC>3W CBDCA/CPT-11

NSCLC

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞1W PTX/CBDCA

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	...	...	...	...	...	7
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●						
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	45 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60 分	●						
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 2 250 mL	点滴静注	60 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞4W PTX/CBDCA

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	15	...	...	28
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●				●		●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●		●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	70 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PTX/CBDCA (AUC6)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W アブラキサン/CBDCA

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	15	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4. 95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6. 6 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PEM/CBDCA

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム3A 注	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PEM/CBDCA(高齢者用：AUC5)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキシド注 生理食塩液	500 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム3A 注	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキシド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキシド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W VNR/CBDCA

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	8	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分						●				
ロゼウス注 生理食塩液	25 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 分	●					●				
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 4 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W GEM/CBDCA

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	8	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分						●				
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●					●				
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W DTX/CBDCA

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	60 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W S-1/CBDCA

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	14	15	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4. 95mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エスワン	* 下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●			

- ・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
 - ・ エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)から Day15(朝食後)まで服用します。
- (* エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1. 25m2 未満：80mg/日, 1. 25m2 以上 1. 5m2 未満：100mg/日, 1. 5m2 以上：120mg/日)



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W CDDP/GEM

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9. 9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6. 6mg 100 mL	点滴静注	30 分					●					
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分					●					

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W CDDP/VNR

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分					●					
ロゼウス注 生理食塩液	25 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 分					●					

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W PEM/CDDP

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム 3A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : NSCLC>3W DTX

1 コースの日数： 21 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PEM

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : NSCLC>1W GEM

1コースの日数： 7日

(※ 原則として、3週（1週おきに3回）投薬後、翌週休薬）

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : NSCLC>1W PTX

1コースの日数： 7日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>1W アブラキサン

1コースの日数： 7日

(※ 原則として、3週（1週おきに3回）投薬後、翌週休薬）

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W エンハーツ(初), NSCLC＞3W エンハーツ(2 回-)

1 コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	...	...	...	...	...	...	...	21
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンハーツ点滴静注 5%ブドウ糖液	5.4 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回 90 分 2 回- 30 分	●									
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・初回のみ点滴開始前にアセトアミノフェン錠 2 錠 を内服します。



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : NSCLC>4W イミフィゾ (CRT 後, BW>30kg)

1 コースの日数： 28 日

[illegible]



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W BV(90(60)(30)min)+PTX/CBDCA

1コースの日数： 21 日

* アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分 と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W BV(90(60)(30)min)+PEM/CBDCA

1コースの日数： 21日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10分	●									
ソルデム3A	200 mL	点滴静注	30分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分(→60分→30分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2～3は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。

・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W BV(90(60)(30)min)+PEM

1コースの日数： 21日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分(→60分→30分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W BV(90(60)(30)min)+アブラキサン

1コースの日数： 21 日

* アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分 と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	21
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m ² (0 mL)	点滴静注	30 分	●			●			●			
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

1 コースの日数： 21 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>2W RAM/Erlotinib

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	14
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
サイラムザ注 生理食塩液	10 mg/kg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エルロチニブ錠*	150 mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* 原則 エルロチニブ錠を用いますが、ゲフィチニブ錠を使用することもできます。

(引用文献：Lancet Oncol 2019；20：1655-69)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W ポートラーザ + GEM/CDDP (Sq)

1 コースの日数： 21 日 ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125-80-80 mg	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6. 6mg 100 mL	点滴静注	30 分					●					
ポートラーザ注 生理食塩液	800 mg 200 mL	点滴静注	60 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9. 9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1250 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分					●					

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

1 コースの日数： 21 日

[illegible]

- ・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服する。
- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

レジメン名：NSCLC>3W ライブ リバント+CBDCA/PEM (2kr, BW<80kg)

1 コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	...	...	8	...	...	15	...	...	21
アプレピタントカプセル	125-80-80 mg	内服		●	●	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●											
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●											
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●											
アセリオ注	1000 mg	点滴静注	15 分	●											
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●											
ライブリバント注 生理食塩液	1400 mg 250 mL	点滴静注	125mL/hr	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●											
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服する。
- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 22 日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 22 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

レジメン名：NSCLC>3W ライブリバント+CBDCA/PEM (3-4kr, BW<80kg)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	...	...	8	...	...	15	...	...	21
アプレピタントカプセル	125-80-80 mg	内服		●	●	●									
デキサート注	9.9 mg	点滴静注	30 分	●											
パロノセトロン注	0.75 mg														
生理食塩液	100 mL														
ペメトレキシド注	500 mg/m ²	点滴静注	10 分	●											
生理食塩液	50 mL														
カルボプラチン注	AUC 6	点滴静注	60 分	●											
5%ブドウ糖液	250 mL														
アセリオ注	1000 mg	点滴静注	15 分	●											
ポララミン注	5 mg	点滴静注	15 分	●											
生理食塩液	50 mL														
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●											
ライブリバント注	1750 mg	点滴静注	125mL/hr	●											
生理食塩液	250 mL														
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●											
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服する。
- ・パンビタン末：ペメトレキシド注投与開始 7 日前から投与中止後 22 日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキシド注投与開始 7 日前から投与中止後 22 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

レジメン名：NSCLC>3W ライブリバント+PEM(5kr-, BW<80kg)

1 コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	...	...	8	...	...	15	...	...	21
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●											
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	60 分	●											
アセリオ注	1000 mg	点滴静注	15 分	●											
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●											
ライブリバント注 生理食塩液	1750 mg 250 mL	点滴静注	125mL/hr	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●											
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

レジメン名：NSCLC>3W リブロファズ+CBDCA/PEM(初回)

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	...	...	8	...	...	15	...	...	21
アプレピタントカプセル	125-80-80 mg	内服		●	●	●									
デキサート注	9.9 mg	点滴静注	30分	●											
パロノセトロン注	0.75 mg														
生理食塩液	100 mL														
ペメトレキセド注	500 mg/m ²	点滴静注	10分	●											
生理食塩液	50 mL														
カルボプラチン注	AUC 5	点滴静注	60分	●											
5%ブドウ糖液	250 mL														
アセリオ注	1000mg	点滴静注	15分	●											
ポララミン注	5 mg	点滴静注	15分	●											
生理食塩液	50 mL														
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●											
リブロファズ配合皮下注	1600mg (BW<80kg) 2400mg (BW≥80kg)	皮下注	5分	●											
リブロファズ配合皮下注	2400mg (BW<80kg) 3360mg (BW≥80kg)								●			●			
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2～3は午前中に内服する。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

レジメン名：NSCLC>3W リブロファズ+CBDCA/PEM(2-4Kr)

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	...	...	8	...	...	15	...	...	21
ポララミン錠	4mg	リブロファズ投与前		●											
アセトアミノフェン錠	800mg	リブロファズ投与前		●											
リブロファズ配合皮下注	2400mg (BW<80kg) 3360mg (BW≥80kg)	皮下注	5分	●											
アプレピタントカプセル	125-80-80 mg	内服		●	●	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●											
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10分	●											
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●											
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・ポララミン錠およびアセトアミノフェン錠：リブロファズ投与前に服用
- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2～3は午前中に内服する。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

レジメン名：NSCLC>3W リブロファズ+PEM(5Kr-)

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	...	...	8	...	...	15	...	...	21
ポララミン錠	4mg	リブロファズ投与前		●											
アセトアミノフェン錠	800mg	リブロファズ投与前		●											
リブロファズ配合皮下注	2400mg (BW<80kg) 3360mg (BW≥80kg)	皮下注	5分	●											
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●											
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●											
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・ポララミン錠およびアセトアミノフェン錠：リブロファズ投与前に服用
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

レジメン名：NSCLC＞4W リブロファズ+ラズクルーズ（初回）

1 コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	...	...	8	...	...	15	...	...	22	...	28
ポララミン錠	4mg	リブロファズ投与前		●			●			●			●		
アセトアミノフェン錠	800mg	リブロファズ投与前		●			●			●			●		
リブロファズ配合皮下注	1600mg (BW<80kg) 2240mg (BW≥80kg)	皮下注	5 分	●			●			●			●		
ラズクルーズ錠	240mg × 1/日	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エリキュース錠	2. 5mg × 2/日	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・ポララミン錠およびアセトアミノフェン錠：リブロファズ投与前に服用

・エリキュース（アピキサバン）錠：リブロファズ+ラズクルーズ併用療法開始後少なくとも4カ月間は服用

レジメン名：NSCLC＞2W リブフロファズ+ラズクルーズ（2kr-）

1コースの日数： 14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14
ポララミン錠	4mg	リブロファズ投与前		●											
アセトアミノフェン錠	800mg	リブロファズ投与前		●											
リブロファズ配合皮下注	1600mg (BW<80kg) 2240mg (BW≥80kg)	皮下注	5 分	●											
ラズクルーズ錠	240mg × 1/日	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エリキュース錠	2. 5mg × 2/日	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・ポララミン錠およびアセトアミノフェン錠：リブフロファズ投与前に服用

・エリキュース（アピキサバン）錠：リブフロファズ+ラズクルーズ併用療法開始後少なくとも4カ月間は服用



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：共通>2W オプジーボ（240 mg/body）

1 コースの日数： 14 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：共通>4W オプジーボ（480 mg/body）

1 コースの日数： 28 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：共通>3W キイトルーダ（200 mg/body）

1 コースの日数： 21 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：共通>6W キイトルーダ（400 mg/body）

1 コースの日数： 42 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞6W オプジーボ／ヤーボイ

1コースの日数： 42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	22	...	...	...	42
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●					●				
オプジーボ注	360 mg	点滴静注	30 分	●					●				
生理食塩液	50 mL												
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注	1 mg/kg	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	20 mL												
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>6W オプジーボ／ヤーボイ+CDDP/PEM

1 コースの日数： 42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	22	23	24	...	...	42
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●		●	●	●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●				●					
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●				●					
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10 分	●				●					
ソルデム3A	200 mL	点滴静注	30 分	●				●					
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m ² 500 mL	点滴静注	60 分	●				●					
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●				●					
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●				●					

パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
--------	------	----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- ・ アプレピタントカプセル：Day1（22）は治療前、Day2～3（23～24）は午前中に内服します。
- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>6W オプジーボ／ヤーボイ+CBDCA/PEM

1 コースの日数： 42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	22	23	24	...	...	42
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●		●	●	●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●				●					
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4. 95mg 0. 75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●				●					
ソルデム3A	200 mL	点滴静注	30 分	●				●					
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
パンビタン末	0. 5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1（22）は治療前、Day2～3（23～24）は午前中に内服します。

- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>6W オプジーボ／ヤーボイ+CBDCA/PTX

1 コースの日数： 42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	22	23	24	...	...	42
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●		●	●	●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●				●					
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●				●					
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●				●					

生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
-------	-------	------	--------	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

・ アプレピタントカプセル : Day1 (22) は治療前、Day2～3 (23～24) は午前中に内服します。

レジメン名：NSCLC>3W オプジーボ／BV (90 (60) (30) min) +CBDCA/PTX 1コースの日数： 21 日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

[illegible]

- ・ アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W オプジーボ／BV（30min）

1 コースの日数： 21 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W キイトルーダ+CBDCA/PEM(non-Sq) 1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム3A 注	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W キイトルーダ+CBDCA/PTX(Sq)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W キイトルーダ+CBDCA／アブラキサン(Sq)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	15	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W テセントリク (60(30)min)

1 コースの日数： 21 日

* テセントリク注（忍容性があれば、60分→30分 と時間短縮することができる）

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン レジメン名：NSCLC>3W テセントリク (60 (30)min)/BV (90 (60) (30)min)+CBDCA/PTX (nonSq)

1 コースの日数： 21 日 ・ アプレピタントカプセル： Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

* テセントリク注（忍容性があれば、60分→30分 と時間短縮可能）* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮可能）

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W テセントリク (60 (30)min)+CBDCA/アブラキサン (non-Sq)

1 コースの日数： 21 日 * テセントリク注（忍容性があれば、60 分→30 分 と時間短縮可能）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	15	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 (→30 分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W テセントリク (60 (30)min)+CDDP/PEM

1 コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 →30 分	●									
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム3A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。

- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W テセントリク (60 (30)min)+CBDCA/PEM

1 コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 →30 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4. 95mg 0. 75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム3A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0. 5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : NSCLC>3W イズト[®]/イミフィンゾ[®] (BW>30kg)+CDDP/PEM

1 コースの日数： 21 日

[illegible]

マンニトール注	500 mL	点滴静注	45～60 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- ・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : NSCLC>3W イジ`ト`/イミフィンジ (BW>30kg)+CBDCA/PEM

1 コースの日数： 21 日

[illegible]

- ・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W イジユド[®]/イミフィンジ[®] (BW>30kg)+CBDCA/アブラキサン

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イジユド点滴静注 生理食塩液	75 mg 100 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>8W イジュード/イミフィンジ（維持療法初回, BW>30kg）

1コースの日数： 56 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	29	...	...	...	56
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●					●				
イジュード点滴静注	75 mg	点滴静注	60 分						●				
生理食塩液	100 mL												
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分						●				
イミフィンジ注	1500 mg	点滴静注	60 分	●					●				
生理食塩液	250 mL												
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>8W イジュード/イミフィンジ+PEM(維持療法初回, BW>30kg)

1コースの日数： 56日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	29	...	...	...	56
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●					●				
イジュード点滴静注 生理食塩液	75 mg 100 mL	点滴静注	60分						●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分						●				
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60分	●					●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●					●				
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●					●				
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m ² 50 mL	点滴静注	10分	●					●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●					●				

- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : NSCLC>4W イミフィンゾ (維持療法, BW>30kg)

1 コースの日数： 28 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>4W イミフィンジ+PEM(維持療法, BW>30kg)

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イミフィンジ注	1500 mg	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	250 mL												
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注	6.6 mg	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	100 mL												
ペメトレキセド注	500 mg/m ²	点滴静注	10 分	●									
生理食塩液	50 mL												
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W リブタヨ+PTX/CBDCA 1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
リブタヨ注 生理食塩液	350 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W リバ*婦 1コースの日数： 21日

[illegible]

SCLC

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W CDDP/VP-16 1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9. 9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6. 6mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分		●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W CBDCA/VP-16 (100mg/m²)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W CBDCA/VP-16 (80mg/m²:高齢)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W CBDCA/CPT-11

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125-80-80 mg	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分					●					
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	50 mg/m ² 250 mL	点滴静注	90分	●				●					
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 4 250 mL	点滴静注	60分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●				●					

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2～3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>4W CDDP/CPT-11

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	15	...	...	28
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9. 9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●		●			
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	60 mg/m2 250 mL	点滴静注	90 分	●				●		●			
シスプラチン注 生理食塩液	60 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分					●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W AMR

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
カルセド注 生理食塩液	35 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W NGT

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	...	...	...	...	21
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●	●	●	●					
ハイカムチン注 生理食塩液	1 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30 分	●	●	●	●	●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●	●	●					

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>1W CPT-11

1コースの日数： 7日

(* 原則として、3週（1週おきに3回）投薬後、翌週休薬）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	...	...	...	...	7
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : SCLC>4W イムテトラ(1kr)

1 コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	...	...	8	...	...	15	...	...	21
デキサート注 生理食塩液	8.25 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			
イムデトラ注 生理食塩液	1 mg 10 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●			●			●			
生理食塩液	1000 mL	点滴静注	5～10 分	●			●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分							●			

レジメン名 : SCLC>2W イムテトラ (2kr-)

1コースの日数： 14 日

[illegible]



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W テセントリク（60（30）min）+CBDCA/VP-16(100mg/m²)

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 (→30 分)	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W テセントリク（60（30）min）+CBDCA/VP-16（80mg/m²:高齢）

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 (→30 分)	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

1 コースの日数： 21 日

[illegible]

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W イミフィンジ(BW>30kg)+CDDP/VP-16 1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21	
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●										
イミフィンジ注	1500 mg	点滴静注	60 分	●										
生理食塩液	250 mL													
硫酸 Mg 補正液	20 mEq	点滴静注	60 分	●										
生理食塩液	500 mL													
デキサート注	9.9mg	点滴静注	30 分	●										
グラニセトロン注	1 mg													
生理食塩液	100 mL													
デキサート注	6.6mg	点滴静注	30 分		●	●								
生理食塩液	100 mL													
エトポシド注	100 mg/m2	点滴静注	120 分	●	●	●								
5%ブドウ糖液	500 mL													
シスプラチン注	80 mg/m2	点滴静注	60 分	●										
生理食塩液	500 mL													
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●										
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分		●	●								

・ アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>3W イミフィンジ（BW>30kg）+CBDCA/VP-16（100mg/m²）or（高齢者 80mg/m²）

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	80-100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

- ・ アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

悪性胸膜中皮腫

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫＞3W PEM/CDDP

1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム 3A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫＞3W PEM/CBDCA

1 コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	...	...	...	...	...	21
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4. 95mg 0. 75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム 3A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0. 5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫＞6W オプジーボ／ヤーボイ

1コースの日数： 42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	...	22	...	...	...	42
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●					●				
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●					●				
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				