

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（乳腺外科）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2023 年 12 月 11 日

○ 更新内容

2023 年 12 月 11 日

- ・ Pembro>3W キイトルーダ+PTX/CBDCA（AUC5）療法 を追加しました。
- ・ Pembro>3W キイトルーダ+PTX/CBDCA（AUC1.5）療法 を追加しました。
- ・ Pembro>3W キイトルーダ+EC 療法 を追加しました。
- ・ Pembro>3W キイトルーダ+AC 療法 を追加しました。

2021 年 12 月 1 日

- ・ Pembro>【12W】キイトルーダ（d1/q3W）／PTX 療法 を追加しました。
- ・ Pembro>3W キイトルーダ+GEM/CBDCA 療法 を追加しました。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : EC>3W EC

1コースの日数 : 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	21	
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
エピルビシン注 生理食塩液	100 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : AC>3W AC

1コースの日数 : 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	21	
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
ドキシルビシン注 生理食塩液	60 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : EG>2W ddEC

1コースの日数 : 14日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	14	
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
エピルビシン注 生理食塩液	100 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										
ジーラスタ皮下注	3.6 mg	皮下注				●								

- ・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。
- ・ジーラスタ皮下注は診療の都合上、別の日に投与することがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：AC>2W ddAC

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	14	
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
ドキシルビシン注 生理食塩液	60 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										
ジーラスタ皮下注	3.6 mg	皮下注				●								

- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。
- ・ジーラスタ皮下注は診療の都合上、別の日に投与することがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：CMF>4W CMF（内服GPA）

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	8	...	15	28	
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●				●						
フルオロウラシル注 生理食塩液	500 mg/m ² 100 mL	点滴静注	60分	●				●						
メソトレキセート注 5%ブドウ糖液	40 mg/m ² 50 mL	点滴静注	30分	●				●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●				●						
エンドキサン錠	100 mg/m ²	内服	(14日間)		●	●	●	●	●	●				

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：PTX>1W PTX

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	7	
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : HER>3W HER (8mg APAP)/1W PTX

1コースの日数 : 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	21		
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●											
トラスツズマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	90分	●											
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●			●				●				
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●			●				●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●				●				
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60分	●			●				●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●				●				

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：HER>3W HER(6mg)/1W PTX

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●			●				●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●			●				●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●				●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●			●				●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●				●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER>3W PER(初)/HER(8mg, APAP)/1W PTX

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●										
パージェタ注	840 mg	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	250 mL													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										
トラスツズマブ注	8 mg/kg	点滴静注	90分	●										
生理食塩液	250 mL													
デキサート注	8.25 mg	点滴静注	30分	●			●				●			
ファモチジン注	20 mg													
生理食塩液	100 mL													
ポララミン注	5 mg	点滴静注	15分	●			●				●			
生理食塩液	50 mL													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●				●			
パクリタキセル注	80 mg/m ²	点滴静注	60分	●			●				●			
5%ブドウ糖液	250 mL													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●				●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER>3W PER(2回-)/HER(6mg)/1W PTX

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	
パージェタ注 生理食塩液	420 mg 250 mL	点滴静注	30分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●			●			●				
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●			●			●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●			●				
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●			●			●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●			●				

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER>3W PER(初)/HER(8mg, APAP)/ERI

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	8	9	21	
アセトアミノフェン錠	400 mg	経口		●										
パージェタ注 生理食塩液	840 mg 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										
トラスツズマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	90分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●				●						
ハラヴェン注 生理食塩液	1.4 mg/m2 50 mL	点滴静注	5~10分	●				●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●				●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：PER/HER>3W PER(2回-)/HER(6mg)/ERI

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	8	9	21	
パージェタ注 生理食塩液	420 mg 250 mL	点滴静注	30分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										
トラスツズマブ注 生理食塩液	6 mg/kg 250 mL	点滴静注	30分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●				●						
ハラヴェン注 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5~10分	●				●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●				●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：VNR>1W VNR

1コースの日数： 7日

(* 原則として、2週(1週おきに2回)投薬後、翌週休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	7
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						
ナベルビン注 生理食塩液	25 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5~10分	●						
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30分	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：GPT-11>1W GPT-11

1コースの日数： 7日

(* 原則として、4週（1週おきに4回）投薬後、2週（翌週および翌々週）休薬)

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day							
				1	2	7	
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：BV>4W BV（初 90→60min）（30min）/PTX

1コースの日数： 28日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	28
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●			●			●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●			●			●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	90 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●						●			
アバスチン注 生理食塩液	10 mg/kg 100 mL(全量)	点滴静注	90分(→60分→30分)	●						●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●			●			●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：BV>4W BV（初 90→60min）（30min）/nabPTX

1コースの日数： 28日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	28
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●			●			●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m ² (0 mL)	点滴静注	30分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						●			
アバスチン注 生理食塩液	10 mg/kg 100 mL(全量)	点滴静注	90分(→60分→30分)	●						●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●			●			



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：Atezo>4W テセントリク（初 60→30min）/アブラキサン

1コースの日数： 28日

* テセントリク注（忍容性があれば、60分→30分 と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●			●			
テセントリク注 生理食塩液	840 mg 250 mL	点滴静注	60分 (→30分)	●						●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●						●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m ² (0 mL)	点滴静注	30分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●			●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：Pembro>【12W】キイトルーダ／PTX

1コースの日数： 84日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	...	8	...	15	...	22	...	29	...		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●						●					
ペムブロリズマブ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30分	●						●					
デキサメタゾン注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg (→6.6 mg →3.3 mg →1.65 mg) 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●		●		●				●			
d-クロルフェニラミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●		●		●				●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●		●		●				●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	90 mg/m2 250 mL	点滴静注	60分	●		●		●				●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●		●		●		●		●			

(次ページへつづく)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : Pembro> 【12W】 キイトルーダ/PTX

1コースの日数 : 84日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				36	...	43	...	57	...	64	...	71	...	84
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分			●				●				
ペムブロリズマブ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30分			●				●				
デキサメタゾン注 ファモチジン注 生理食塩液	1.65 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●		●		●		●		●		
d-クロルフェニラミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●		●		●		●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●		●		●		●		●		
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	90 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●		●		●		●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●		●		●		●		●		

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : Pembro>3W キイトルーダ/GEM/CBDCA

1コースの日数 : 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	8	21	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●										
ペムブロリズマブ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30分	●										
デキサメタゾン注 グラニセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●				●						
ゲムシタビン注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	●				●						
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 2 250 mL	点滴静注	60分	●				●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●				●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：Pembro>3W キイトルーダ+PTX/CBDCA (AUC5)

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	...	8	...	15	...	21	
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●										
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						●		●		
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●						●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						●		●		
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60分	●						●		●		
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC5 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						●		●		

※d8,15 :
デキサート注 8.25mg
グラニセトロン注登録なし

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : Pembro>3W キイトルーダ+PTX/CBDCA (AUC1.5)

1コースの日数 : 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	...	8	...	15	...	21	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●										
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						●		●		
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●						●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						●		●		
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60分	●						●		●		
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC1.5 250 mL	点滴静注	60分	●						●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						●		●		

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : Pembro>3W キイトルーダ+EG

1コースの日数 : 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	21	
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●										
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
エピルビシン注 生理食塩液	90 mg/m2 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : Pembro>3W キイトルーダ+AC

1コースの日数 : 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	21	
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●										
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
ドキシソルビシン注 生理食塩液	60 mg/m2 50 mL	点滴静注	5~10分	●										
エンドキサン注 生理食塩液	600 mg/m2 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。