静岡県立総合病院　化学療法レジメン（呼吸器センター）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2024 年 11 月 27 日

○ 更新内容

2024 年 11 月 25 日

下記レジメンを追加しました。

・NSCLC>3W ｴﾝﾊｰﾂ

・NSCLC>4W ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（CRT 後,BW>30kg）

・NSCLC>3W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（BW>30kg）+CDDP/PEM（4 ｺｰｽまで）

・NSCLC>3W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（BW>30kg）+CBDCA/PEM（4 ｺｰｽまで）

・NSCLC>3W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（BW>30kg）+CBDCA/ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ（4 ｺｰｽまで）

・NSCLC>8W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（維持療法初回,BW>30kg）

・NSCLC>8W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+PEM（維持療法初回,BW>30kg）

・NSCLC>4W ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（維持療法,BW>30kg）

・NSCLC>4W ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+PEM（維持療法,BW>30kg）

2022 年 12 月 10 日

・ナベルビン、アリムタ、アロキシをそれぞれロゼウス、ペメトレキセド、パロノセトロンに変更しました。

2021 年 12 月 1 日

・NSCLC＞3W テセントリク＋CDDP/PEM 療法を追加しました。

・NSCLC＞3W テセントリク＋CBDCA/PEM 療法を追加しました。

・NSCLC＞3W オプジーボ／BV＋CBDCA/PTX 療法　を追加しました。
・NSCLC＞3W オプジーボ／BV 療法　を追加しました。
・中皮腫＞6W オプジーボ／ヤーボイ療法　を追加しました。

2021 年 1 月 5 日
・NSCLC> NSCLC＞2W RAM/Erlotinib 療法　を追加しました。
・NSCLC> 6W オプジーボ／ヤーボイ療法　を追加しました。
・NSCLC> 6W オプジーボ／ヤーボイ＋CDDP/PEM 療法　を追加しました。
・NSCLC> 6W オプジーボ／ヤーボイ＋CBDCA/PEM 療法　を追加しました。
・NSCLC> 6W オプジーボ／ヤーボイ＋CBDCA/PTX 療法　を追加しました。
・SCLC＞ 3W イミフィンジ(BW>30kg)+CDDP/VP-16 療法　　を追加しました。
・SCLC＞ 3W イミフィンジ（BW>30kg）/CBDCA+VP-16(100mg/m2)(高齢者 80mg/m2)療法　を追加しました。

NSCLC

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞1W PTX/CBDCA
１コースの日数：　７日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●						
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	45 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●						
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 2 250 mL	点滴静注	60 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞4W PTX/CBDCA

１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	8	･･･	15	･･･	･･･	28
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●				●		●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●		●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	70 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PTX/CBDCA(AUC6)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W アブラキサン/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	8	･･･	15	･･･	･･･	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PEM/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A 注	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。
・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PEM/CBDCA(高齢者用：AUC5)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A 注	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。
・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W VNR/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	8	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分						●				
ロゼウス注 生理食塩液	25 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 分	●					●				
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 4 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W GEM/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	8	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分						●				
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●					●				
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W DTX/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	60 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W S-1/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	14	15	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エスワン	＊下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
・エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)から Day15(朝食後)まで服用します。
（＊エスワン標準的投与量(テガフール相当量)→1.25m2 未満：80mg/日,1.25m2 以上 1.5m2 未満：100mg/日, 1.5m2 以上：120mg/日）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W CDDP/GEM
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	8	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分					●					
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分					●					

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W CDDP/VNR

１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	8	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分					●					
ロゼウス注 生理食塩液	25 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 分					●					

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PEM/CDDP

１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W DTX
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	60 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W PEM
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。
・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞1W VNR
１コースの日数：　７日
(＊　原則として、２週（１週おきに２回）投薬後、翌週休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				１	２	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ロゼウス注 生理食塩液	25 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞1W GEM
１コースの日数：　７日
(＊　原則として、３週（１週おきに３回）投薬後、翌週休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				１	２	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ジェムザール注 ５％ブドウ糖液	1000 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞1W PTX
１コースの日数：　７日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 ５％ブドウ糖液	80 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞1W CPT-11
１コースの日数：　７日
(＊　原則として、３週（１週おきに３回）投薬後、翌週休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
イリノテカン注 ５％ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	90 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞1W アブラキサン
１コースの日数：　７日
(＊　原則として、３週（１週おきに３回）投薬後、翌週休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				１	２	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W ｴﾝﾊｰﾂ(初), NSCLC＞3W ｴﾝﾊｰﾂ(2 回-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンハーツ点滴静注 5%ブドウ糖液	5.4 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回 90 分 2 回- 30 分	●									
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・初回のみ点滴開始前にアセトアミノフェン錠 2 錠 を内服します。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞4W ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（CRT 後,BW>30kg）

１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W BV(90(60)(30)min)+PTX/CBDCA

１コースの日数：　21 日

＊ アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W BV(90(60)(30)min)+PEM/CBDCA

１コースの日数：　21 日

＊ アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３Ａ	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W BV(90(60)(30)min)+PEM

１コースの日数：　21 日

＊ アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W BV(90(60)(30)min)+アブラキサン

１コースの日数：　21 日

＊ アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	8	9	・・・	15	16	・・・	21
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●			●			●			
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●			●			●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W RAM/DTX

１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
サイラムザ注 生理食塩液	10 mg/kg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドセタキセル注 ５％ブドウ糖液	60 mg/m2 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞2W RAM/Erlotinib

１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	14
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
サイラムザ注 生理食塩液	10 mg/kg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エルロチニブ錠＊	150 mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

＊　原則　エルロチニブ錠を用いますが、ゲフィチニブ錠を使用することもできます。

（引用文献：Lancet Oncol 2019 ; 20 :1655-69）

静岡県立総合病院　化学療法レジメン　　レジメン名：NSCLC＞3W ﾎﾟｰﾄﾗｰｻﾞ＋GEM/CDDP(Sq)

１コースの日数：　21 日　・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	8	･･･	･･･	･･･	･･･	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分					●					
ポートラーザ注 生理食塩液	800 mg 200 mL	点滴静注	60 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1250 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分					●					

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：共通＞2W オプジーボ（240 mg/body）
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	14
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
オプジーボ注 生理食塩液	240 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：共通＞4W オプジーボ（480 mg/body）
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
オプジーボ注 生理食塩液	480 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：共通＞3W キイトルーダ（200 mg/body）
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：共通＞6W キイトルーダ（400 mg/body）
１コースの日数：　42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	42
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	400 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞6W オプジーボ／ヤーボイ
１コースの日数：　42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	22	・・・	・・・	・・・	42
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●					●				
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●					●				
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞6W オプジーボ／ヤーボイ+CDDP/PEM　　１コースの日数：　42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	22	23	24	･･･	･･･	42
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●		●	●	●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●				●					
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●				●					
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●				●					
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●				●					
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●				●					
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●				●					
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●				●					

パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1（22）は治療前、Day2～3（23～24）は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約9週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞6W オプジーボ／ヤーボイ+CBDCA/PEM　　１コースの日数：　42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	22	23	24	･･･	･･･	42
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●		●	●	●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●				●					
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●				●					
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●				●					
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1（22）は治療前、Day2～3（23～24）は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。
・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約9週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞6W オプジーボ／ヤーボイ+CBDCA/PTX　　１コースの日数：　42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	22	23	24	･･･	･･･	42
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●		●	●	●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●				●					
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●					
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●				●					
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●				●					
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●				●					

生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●					

・アプレピタントカプセル：Day1（22）は治療前、Day2～3（23～24）は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W オプジーボ／BV（90（60）（30）min）＋CBDCA/PTX　　１コースの日数：　21 日

＊ アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●									
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W オプジーボ／BV（30min）　　１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W キイトルーダ＋CBDCA/PEM(non-Sq)　１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A 注	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。
・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W キイトルーダ+CBDCA/PTX(Sq)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W キイトルーダ＋CBDCA／アブラキサン(Sq)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	8	･･･	15	･･･	･･･	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W テセントリク(60(30)min)
１コースの日数：　21 日
＊ テセントリク注（忍容性があれば、60 分→30 分　と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 （→30 分）	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン　レジメン名：NSCLC＞3W テセントリク(60(30)min)/BV(90(60)(30)min)+CBDCA/PTX(nonSq)

１コースの日数：　21 日　・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

＊ テセントリク注（忍容性があれば、60 分→30 分　と時間短縮可能）＊ アバスチン注（忍容性があれば、90 分→60 分→30 分　と時間短縮可能）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 (→30 分)	●									
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分(→60 分→30 分)	●									
デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	200 mg/m2 500 mL	点滴静注	180 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W テセントリク(60(30)min)+CBDCA/アブラキサン(non-Sq)

１コースの日数：　21 日　　＊テセントリク注（忍容性があれば、60 分→30 分　と時間短縮可能）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	8	･･･	15	･･･	･･･	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 (→30 分)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W テセントリク(60(30)min)+CDDP/PEM　　１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 →30 分	●									
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約9週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W テセントリク(60(30)min)+CBDCA/PEM　　１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 →30 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(BW>30kg)+CDDP/PEM

１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イジュド点滴静注 生理食塩液	75 mg 100 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									

マンニトール注	500 mL	点滴静注	45～60 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。
・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(BW>30kg)+CBDCA/PEM

１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イジュド点滴静注 生理食塩液	75 mg 100 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。
・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞3W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(BW>30kg)+CBDCA/ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ

１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イジュド点滴静注 生理食塩液	75 mg 100 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
アブラキサン注 生理食塩液	100 mg/m2 (0 mL)	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞8W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（維持療法初回,BW>30kg）

１コースの日数：　56 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	･･･	29	･･･	･･･	･･･	56
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●					●				
イジュド点滴静注 生理食塩液	75 mg 100 mL	点滴静注	60 分						●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分						●				
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●					●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞8W ｲｼﾞｭﾄﾞ/ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+PEM(維持療法初回,BW>30kg)

１コースの日数：　56 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	･･･	29	･･･	･･･	･･･	56
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●					●				
イジュド点滴静注 生理食塩液	75 mg 100 mL	点滴静注	60 分						●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分						●				
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●					●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●					●				
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●					●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞4W ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（維持療法,BW>30kg）

１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC＞4W ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+PEM(維持療法,BW>30kg)

１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

SCLC

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W CDDP/VP-16　１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分		●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W CBDCA/VP-16(100mg/m2)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W CBDCA/VP-16(80mg/m2:高齢)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞4W CBDCA/CPT-11
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	8	･･･	15	･･･	･･･	28
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分					●		●			
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	50 mg/m2 250 mL	点滴静注	90 分	●				●		●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞4W CDDP/CPT-11
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	8	・・・	15	・・・	・・・	28
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●		●			
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	60 mg/m2 250 mL	点滴静注	90 分	●				●		●			
シスプラチン注 生理食塩液	60 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分					●		●			

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W AMR
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
カルセド注 生理食塩液	35 mg/m2 50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W NGT
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●	●	●	●					
ハイカムチン注 生理食塩液	1 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●	●	●	●	●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞1W CPT-11
１コースの日数：　７日
(＊　原則として、３週（１週おきに３回）投薬後、翌週休薬)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				１	２	・・・	・・・	・・・	・・・	７
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	90 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W テセントリク（60（30）min）＋CBDCA/VP-16(100mg/m2)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 （→30 分）	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W テセントリク（60（30）min）＋CBDCA/VP-16(80mg/m2:高齢)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分 （→30 分）	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W テセントリク（30min）
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W イミフィンジ(BW>30kg)+CDDP/VP-16　１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分		●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：SCLC＞3W イミフィンジ（BW>30kg）＋CBDCA/VP-16(100mg/m2)or(高齢者 80mg/m2)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
エトポシド注 5%ブドウ糖液	80-100 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●							
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●							

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

悪性胸膜中皮腫

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫＞3W PEM/CDDP

１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
硫酸 Mg 補正液 生理食塩液	20 mEq 500 mL	点滴静注	60 分	●									
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m2 500 mL	点滴静注	60 分	●									
マンニトール注	500 mL	点滴静注	45 分	●									
生理食塩液	500 mL	点滴静注	60 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。

・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫＞3W PEM/CBDCA
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アプレピタントカプセル	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服		●	●	●							
デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液	4.95mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ペメトレキセド注 生理食塩液	500 mg/m2 50 mL	点滴静注	10 分	●									
ソルデム３A	200 mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴静注	60 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
パンビタン末	0.5g	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで可能な限り投与する。
・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始７日前から投与中止後２２日まで約 9 週毎に１回投与する。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫＞6W オプジーボ／ヤーボイ
１コースの日数：　42 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	・・・	22	・・・	・・・	・・・	42
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●					●				
オプジーボ注 生理食塩液	360 mg 50 mL	点滴静注	30 分	●					●				
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分	●									
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●					●				