

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（消化器内科・腫瘍内科：大腸）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2022 年 12 月 10 日

○更新内容

2022 年 12 月 10 日

消化器内科・腫瘍内科ファイルを臓器別に分けました。

・大腸＞3W オプジーボ/ヤーボイ療法を追加しました。

2021 年 3 月 22 日

・大腸＞1W Cmab 単独 療法 を追加しました。

2020 年 12 月 10 日

・大腸＞3W XELIRI CPT-11:d1/Cape 2 投 1 休 カペシタビン用量記載

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W XELOX L-OHP:d1/カペシタビン:2 投1 休

1コースの日数：21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21		
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●												
エルプラット注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120 分	●												
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5~10 分	●												
カペシタビン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

- カペシタビンは、Day1(夕食後)から Day15(朝食後)まで服用します。カペシタビン標準的投与量→1.36 m²未満：1200mg/回,
1.36 m²以上 1.66 m²未満：1500mg/回, 1.66 m²以上 1.96 m²未満：1800mg/回, 1.96 m²以上：2100mg/回 を1日2回

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W BV(90min)(60min)(30min)/XELOX BV,L-OHP:d1/カペシタビン:2投1休

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21		
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
アバスチン注 生理食塩液	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	●												
エルプラット注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●												
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10分	●												
カペシタビン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

● カペシタビンは、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。カペシタビン標準的投与量→1.36 m²未満：1200mg/回,
1.36 m²以上 1.66 m²未満：1500mg/回, 1.66 m²以上 1.96 m²未満：1800mg/回, 1.96 m²以上：2100mg/回 を1日2回

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W SOX L-OHP:d1/S-1:2 投1休

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21		
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
エルプラット注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●												
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5~10分	●												
エスワン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

●エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。

(エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m²未満：80mg/日, 1.25m²以上 1.5m²未満：100mg/日, 1.5m²以上：120mg/日)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W BV(90min)(60min)(30min)/SOX BV,L-OHP:d1/S-1:2 投1休

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21		
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
アバスチン注 生理食塩液	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	●												
エルプラット注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●												
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10分	●												
エスワン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

●エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。

(エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m²未満：80mg/日, 1.25m²以上 1.5m²未満：100mg/日, 1.5m²以上：120mg/日)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W XELOX (DEX 混注) L-OHP:d1/カペシタビン:2 投1 休

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21		
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	8.25 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
エルプラット注 デキサート注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 1.65 mg 500 mL	点滴静注	120分	●												
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5~10分	●												
カペシタビン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

● カペシタビンは、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。カペシタビン標準的投与量→1.36 m²未満：1200mg/回,
1.36 m²以上 1.66 m²未満：1500mg/回, 1.66 m²以上 1.96 m²未満：1800mg/回, 1.96 m²以上：2100mg/回 を1日2回

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W BV(90min)(60min)(30min)/XELOX(DEX混注) BV,L-OHP:d1/カペシタビン:2投1休

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21		
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	8.25 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
アバスタチン注 生理食塩液	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	●												
エルプラット注 デキサート注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 1.65 mg 500 mL	点滴静注	120分	●												
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10分	●												
カペシタビン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

● カペシタビンは、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。カペシタビン標準的投与量→1.36 m²未満：1200mg/回, 1.36 m²以上 1.66 m²未満：1500mg/回, 1.66 m²以上 1.96 m²未満：1800mg/回, 1.96 m²以上：2100mg/回 を1日2回

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W SOX (DEX 混注) L-OHP:d1/S-1:2 投1休

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21		
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	8.25 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
エルプラット注 デキサート注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 1.65 mg 500 mL	点滴静注	120分	●												
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5~10分	●												
エスワン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

●エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。

(エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m²未満：80mg/日, 1.25m²以上 1.5m²未満：100mg/日, 1.5m²以上：120mg/日)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W BV(90min)(60min)(30min)/SOX(DEX混注) BV,L-OHP:d1/S-1:2投1休

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	21			
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	8.25 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●													
アバスタチン注 生理食塩液	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	●													
エルプラット注 デキサート注 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 1.65 mg 500 mL	点滴静注	120分	●													
5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	5～10分	●													
エスワン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

●エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。

(エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m²未満：80mg/日, 1.25m²以上1.5m²未満：100mg/日, 1.5m²以上：120mg/日)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>2W RAM/FOLFIRI RAM, CPT-11, b-FU, iFU:d1 1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	2	3	4	5	6	7	14			
デキサート注 アロキシ注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●													
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●													
サイラムザ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	60分	●													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●													
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	90分	●													
レボリネート注 生理食塩液	200 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●													
フルオウラシル注 生理食塩液	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5~10分	●													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●													
フルオウラシル注 生理食塩液	2400 mg/m ² 20 mL	点滴静注	46時間	●													
パリンNaシリンジ	1筒			●													

* イリノテカン注は 180 mg/m²で使用されることがあります。(腫瘍内科)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>2W ギララップ®/FOLFIRI

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	14		
デキサート注 アロキシ静注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●												
ギララップ注 生理食塩液	4 mg/kg 100 mL	点滴静注	60分	●												
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	90分	●												
レボレチン注 生理食塩液	200 mg/m ² 500 mL	点滴静注	120分	●												
フルオウラシル注 生理食塩液	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5~10分	●												
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●												
フルオウラシル注 生理食塩液	2400 mg/m ² 20 mL	点滴静注	46時間	●												
ハリンNaシリンジ	1筒			●												

*イリノテカン注は 180 mg/m²で使用されることがあります。(腫瘍内科)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>4W IRIS GPT-11:d1,15/S-1:2 投2休

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	28		
デキサート注 グラネトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										●		
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●										●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										●		
エスワン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

●エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。

(エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m²未満：80mg/日, 1.25m²以上 1.5m²未満：100mg/日, 1.5m²以上：120mg/日)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>4W BV(90→60min)(30min)/IRIS CPT-11:d1,15/S-1:2 投2休

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	15	...	28		
デキサート注 グラネトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										●		
アバスタチン注 生理食塩液	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分 (2コース目以降：30分)	●												
アバスタチン注 生理食塩液	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	60分 (2コース目以降：30分)											●		
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●										●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●										●		
エスワン	●下記参照	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

●エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。

(エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m²未満：80mg/日, 1.25m²以上 1.5m²未満：100mg/日, 1.5m²以上：120mg/日)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>2W CPT-11 CPT-11:d1

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	4	14	
デキサート注 アロキシ注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>2W BV(90min)(60min)(30min)/ GPT-11 BV,GPT-11:d1

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	4	14	
デキサート注 アロキシ注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
アバスチン注 生理食塩液	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回：90分 2回目：60分 3回目以降：30分	●							
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>2W Cmab(1コース目)(2コース目以降)/CPT-11 Cmab:d1,8/CPT-11:d1

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	...	8	...	14	
デキサート注 アロキシ注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分					●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●				●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							
7-ヒタックス注 生理食塩液	初回：400 mg/m ² 2回目以降：250 mg/m ² 初回：500 mL 2回目以降：250 mL	点滴静注	初回：120分 2回目以降：60分	●				●			
生理食塩液	100 mL (2コース目以降 50mL)	点滴静注	60分 (2コース目以降 15分)	●							
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分					●			
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>2W Pmab/CPT-11 Pmab, CPT-11:d1

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	...	8	...	14	
デキサート注 アロキシ注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							
ベクテビックス注 生理食塩液	6 mg/kg 100 mL	点滴静注	60分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	30分	●							
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W XELIRI CPT-11:d1/Cape 2投1休

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day								
				1	2	3	...	15	21	
デキサート注 アロキシ注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●								
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●								
カペシタビン錠	●下記参照	内服		●	●	●	●	●				

- カペシタビンは、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。

カペシタビン標準的投与量→1.31m²未満：900mg/回, 1.31m²以上1.69m²未満：1200mg/回, 1.69m²以上2.07m²未満：1500mg/回
2.07m²以上：1800mg/回 を1日2回

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>2W Cmab(1コース目)(2コース目以降)/CPT-11 Cmab:d1,8/CPT-11:d1

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	...	8	...	14	
デキサート注 アロキシ注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分					●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●				●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●							
7-ヒタックス注 生理食塩液	初回：400 mg/m ² 2回目以降：250 mg/m ² 初回：500 mL 2回目以降：250 mL	点滴静注	初回：120分 2回目以降：60分	●				●			
生理食塩液	100 mL (2コース目以降 50mL)	点滴静注	60分 (2コース目以降 15分)	●							
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分					●			
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>1W Cmab 単独 (初回) (2回目以降) Cmab:d1

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	7
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●						
アビタックス注 生理食塩液	初回：400 mg/m ² 2回目以降：250 mg/m ² 初回：500 mL 2回目以降：250 mL	点滴静注	初回：120分 2回目以降：60分	●						
生理食塩液	100 mL	点滴静注	60分	●						

ビラフトビカプセル および メクトビ錠 との 併用時

- ・ビラフトビカプセル 300mg/回 を1日1回 (連日)
- ・メクトビ錠 45mg/回 を1日2回 (連日) *メクトビ錠は併用されない場合あり

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：大腸>3W オプジーボ(240 mg/body)/ヤーボイ（4コースまで）

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	21	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●											
オプジーボ注	240 mg	点滴静注	30分	●											
生理食塩液	50 mL														
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30分	●											
ヤーボイ注	1 mg/kg	点滴静注	30分	●											
生理食塩液	20 mL														
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●											

*ヤーボイ注は原則4コースまでです。