静岡県立総合病院　化学療法レジメン（消化器内科・腫瘍内科：膵胆肝）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部DI室にお願いします。（平日13～16時）

● 最終更新日　2023年12月11日

〇更新内容

2024年11月27日

・膵胆>3W キイトルーダ+GEM/CDDP療法および膵胆>3W キイトルーダ+GEM療法を追加しました。

2023年12月11日

・膵胆＞3W イミフィンジ（BW＞30kg）＋GEM/CDDP（8コースまで）療法を追加しました。

・膵胆＞4W イミフィンジ（BW＞30kg）療法を追加しました。

・肝＞4W イジュド/イミフィンジ（BW＞30kg、初回のみ）療法を追加しました。

・肝＞4W イミフィンジ（BW＞30kg）療法を追加しました。

2022年12月10日

消化器内科・腫瘍内科ファイルを臓器別に分けました。

・膵胆＞2W modified FOLFIRINOX療法を追加、膵胆＞2W オニバイド/FU療法を修正しました。

・アロキシ、プロイメンドをそれぞれパロノセトロン、アロカリスに変更しました。

2020年12月10日

・肝＞3W テセントリク(60min)/BV(90min), 肝＞3W テセントリク(30min)/BV(60min),肝＞3W テセントリク(30min)/BV(30min)療法 を追加しました。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞1W GEM(化療単独)　GEM:d1　　１コースの日数：（下記参照）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	7
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

・ジェムザール注（単独療法）→原則　３週間投薬（１週ごと３回投薬）を行い、１週間休薬

・エスワン配合錠（カプセル）との併用療法：膵がん【 術前療法（ジェムザール＋エスワン併用療法）の場合 】

ジェムザール注→原則　２週間投薬（Day1,Day8；１週ごと２回投薬）を行い、１週間休薬（Day21 まで休薬）

エスワン→原則、Day1(夕食後)から Day15(朝食後)まで服用します。(以後７日間休薬)

エスワン標準的投与量(テガフール相当量)→1.25m2 未満：80mg/日,1.25m2 以上 1.5m2 未満：100mg/日,
1.5m2 以上：120mg/日

・エスワン配合錠（カプセル）との併用療法：胆道がん（転移・再発の場合）

ジェムザール注→原則　２週間投薬（Day1,Day8；１週ごと２回投薬）を行い、１週間休薬（Day21 まで休薬）

エスワン→原則、Day1(夕食後)から Day15(朝食後)まで服用します。(以後７日間休薬)

エスワン標準的投与量(テガフール相当量)→1.25m2 未満：60mg/日,1.25m2 以上 1.5m2 未満：80mg/日,
1.5m2 以上：100mg/日

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞1W GEM(放治併用)　GEM:d1(3 投 1 休)
１コースの日数：　**日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day								
				1	2	3	･･･	8	･･･	15	･･･	21
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●		●		
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	300 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●				●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●		

・ジェムザール注（単独療法）→原則　３週間投薬（１週ごと３回投薬）を行い、１週間休薬

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞1W CDDP　CDDP:d1
１コースの日数：　７日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	・・・		・・・	7
デキサート注 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
シスプラチン注 生理食塩液	10～30 mg/ body 500 mL	点滴静注	90 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞3W GEM/CDDP　GEM,CDDP:d1,d8
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	・・・	8	・・・	・・・	・・・	21
デキサート注 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				
シスプラチン注 生理食塩液	25 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	90 分	●		●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●		●				

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞2W FOLFIRINOX　L-OHP,CPT-11,b-FU,iFU:d1

１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	6	7	･･･	･･･	･･･	14
デキサート注 ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注 アロカリス注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 235 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●										
エルプラット注 5%ブドウ糖液	85 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	120 分	●										
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	180 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	90 分	●										
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ注 生理食塩液	200 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	120 分	●										
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 生理食塩液	400 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●										
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 生理食塩液	2400 mg/㎡ 20 mL	点滴静注	46 時間	●										
ﾍﾊﾟﾘﾝ Na ｼﾘﾝｼﾞ	1 筒			●										

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞2W modified FOLFIRINOX　L-OHP,CPT-11,b-FU,iFU:d1

１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	6	7	･･･	･･･	･･･	14
デキサート注 ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注 アロカリス注 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 235 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●										
エルプラット注 5%ブドウ糖液	85 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	120 分	●										
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	150 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	90 分	●										
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ注 生理食塩液	200 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	120 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●										
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 生理食塩液	2400 mg/㎡ 20 mL	点滴静注	46 時間	●										
ﾍﾊﾟﾘﾝ Na ｼﾘﾝｼﾞ	1 筒			●										

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞4W ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ/GEM　nabPTX,GEM:d1,8,15
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	･･･	8	･･･	15	･･･	･･･	28
デキサート注 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●		●			
アブラキサン注 生理食塩液	125 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●				●		●			
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●				●		●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●				●		●			

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞2W GEM/CDDP/S-1　GEM,CDDP:d1/S-1:1 投 1 休
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	･･･	8	･･･	･･･	14
デキサート注 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●						
シスプラチン注 生理食塩液	25 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	90 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
エスワン	●下記参照	内服		●	●	●	●			

●　エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)から Day8(朝食後)まで服用します。
（エスワン標準的投与量(テガフール相当量)→1.25m2 未満：80mg/日,1.25m2 以上 1.5m2 未満：100mg/日, 1.5m2 以上：120mg/日）

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞2W オニバイド/FU　nal-IRI,FU:d1
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	14
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	内服	＊	●	●	●				
デキサート注 ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
オニバイド注 5%ブドウ糖液	70 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	90 分	●						
レボホリナート注 生理食塩液	200 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	120 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 生理食塩液	2400 mg/㎡ 20 mL	点滴静注	46 時間	●						
ﾍﾊﾟﾘﾝ Na ｼﾘﾝｼﾞ	1 筒			●						

＊　アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、　Day2～3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞3W イミフィンジ（BW＞30kg）＋GEM/CDDP（8 コースまで）　デュルバルマブ:d1/GEM,CDDP:d1,8
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	・・・	8	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg/body 250 mL	点滴静注	60 分	●						
デキサート注 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				
シスプラチン注 生理食塩液	25 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	90 分	●		●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●		●				

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆＞4W イミフィンジ（BW＞30kg）　デュルバルマブ:d1
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg/body 250 mL	点滴静注	60 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆>3W キイトルーダ+GEM/CDDP　Pembro:d1/GEM,CDDP:d1,8
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	・・・	8	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●						
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg/body 50 mL	点滴静注	30 分	●						
デキサート注 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				
ゲムシタビン注 5%ブドウ糖液	1000 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				
シスプラチン注 生理食塩液	25 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	90 分	●		●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●		●				

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：膵胆>3W キイトルーダ+GEM　Pembro:d1/GEM:d1,8
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	・・・	8	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●						
キイトルーダ注 生理食塩液	200 mg/body 50 mL	点滴静注	30 分	●						
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				
ゲムシタビン注 5%ブドウ糖液	1000 mg/㎡ 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●		●				

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：肝＞2W RAM(nd line 以降、AFP400ng/mL 以上)　RAM:d1
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	6	7	・・・	・・・	・・・	14
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●										
サイラムザ注 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	60 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●										

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：肝＞3W テセントリク(60min)/BV(90min)
肝＞3W テセントリク(30min)/BV(60min)
肝＞3W テセントリク(30min)/BV(30min)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	6	7	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●										
テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	点滴静注	60 分（初回） 30 分（２回目以降）	●										
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90 分（初回） 60 分（２回目） 30 分（３回目以降）	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●										

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：肝＞4W イジュド/イミフィンジ（BW＞30kg、初回のみ）
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	6	7	･･･	･･･	･･･	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●										
イジュド注 生理食塩液	300 mg 100 mL	点滴静注	60 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●										
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●										

レジメン名：肝＞4W イミフィンジ（BW＞30kg）　durvalumab:d1
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	6	7	･･･	･･･	･･･	28
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●										
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg 250 mL	点滴静注	60 分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●										