

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（消化器内科・腫瘍内科：食道）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2022 年 12 月 10 日

○更新内容

2022 年 12 月 10 日

消化器内科・腫瘍内科ファイルを臓器別に分けました。

・食道＞6W オプジーボ/ヤーボイを追加しました。

2021 年 12 月 1 日

・食道＞2W オプジーボ（240mg/body）ニボルマブ：d1 および胃＞2W オプジーボ（240mg/body）ニボルマブ：d1
を免疫チェックポイント阻害薬 共通レジメンに統一しました。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>3W CDDP/FU(術前単 80/800) 1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... | 21 | | | |
| ソルデム 3A 生理食塩液 | 1000 mL 1000 mL | 点滴静注 | 翌朝 9:30 まで | ● | | | | | | | | | | | | |
| アフリタクトカプセル | 125mg (Day2) 80mg (Day3-4) | 内服 | * | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | | | | ● | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | ● | | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 1000 mL | 点滴静注 | 180 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| カオウラシル注 生理食塩液 | 800 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | | | | | | ● | | | | | | |

* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ～ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W CDDP/FU(併単独, 80/800) 1コースの日数： 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... | 28 | | |
| ソルデム 3A 生理食塩液 | 1000 mL 1000 mL | 点滴静注 | 翌朝 9:30 まで | ● | | | | | | | | | | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day2) 80mg (Day3-4) | 内服 | * | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | | | | ● | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 1000 mL | 点滴静注 | 180 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| フルオウラシル注 生理食塩液 | 800 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5～10 分 | | | | | | | ● | | | | | |

* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ～ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W CDDP/FU(50.4Gy, 75/1000) 1コースの日数： 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... | 28 | | |
| ソルデム 3A 生理食塩液 | 1000 mL 1000 mL | 点滴静注 | 翌朝 9:30 まで | ● | | | | | | | | | | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day2) 80mg (Day3-4) | 内服 | * | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 75 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 1000 mL | 点滴静注 | 180 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | | | | | | | |
| フルオウラシル注 生理食塩液 | 1000 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5～10 分 | | | | | | ● | | | | | | |

* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ～ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W CDDP+FU(60Gy/40Gy, 70/700) 1コースの日数： 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... | 28 | | |
| ソルデム 3A 生理食塩液 | 1000 mL 1000 mL | 点滴静注 | 翌朝 9:30 まで | ● | | | | | | | | | | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day2) 80mg (Day3-4) | 内服 | * | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 70 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 1000 mL | 点滴静注 | 180 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | | | | | | | |
| フルオウラシル注 生理食塩液 | 700 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | | | | | ● | | | | | | |

* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>JCOG1109>3W CDDP/FU(80/800) 1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... | 21 | | |
| ソルデム 3A 生理食塩液 | 1000 mL 1000 mL | 点滴静注 | 翌朝 9:30 まで | ● | | | | | | | | | | | |
| アプロピタトカプセル | 125mg (Day2) 80mg (Day3-4) | 内服 | * | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | | | | ● | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 1000 mL | 点滴静注 | 180 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| カルボプラチン注 生理食塩液 | 800 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | | | | | | ● | | | | | |

* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ～ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>JCOG1109>4W CDDP/FU(41.4Gy, 75/1000) 1コースの日数： 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... | 28 | | | |
| ソルデム 3A 生理食塩液 | 1000 mL 1000 mL | 点滴静注 | 翌朝 9:30 まで | ● | | | | | | | | | | | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day2) 80mg (Day3-4) | 内服 | * | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラネセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 75 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | ● | | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 1000 mL | 点滴静注 | 180 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | | | | | | | | |
| フルオウラシル注 生理食塩液 | 1000 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5～10 分 | | | | | | ● | | | | | | | |

* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ～ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>5W NED/FU(ㄱ单独) NED:d1/FU:d1-5

1コースの日数： 35日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... | ... | 35 | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | ● | ● | | | | | | |
| アクプラ注 生理食塩注 | 90 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 90分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 1000 mL | 点滴静注 | 180分 | ● | | | | | | | | | | |
| ガオウラル注 生理食塩液 | 800 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5～10分 | | | | | | ● | | | | | |

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>5W NED/FU(RT 併用) NED:d1/FU:d1-5

1コースの日数： 35日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... | ... | 35 | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | ● | ● | | | | | | |
| アクプラ注 生理食塩注 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 90分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 1000 mL | 点滴静注 | 180分 | ● | | | | | | | | | | |
| フルオウラシル注 生理食塩液 | 800 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | | | | | | ● | | | | | |

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W NED/VDS NED:d1/VDS:d1,8

1コースの日数： 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | 28 | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 15分 | | | | | ● | | | | | | | |
| フィルデシン注 生理食塩液 | 3 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | | | | | | |
| アクプラ注 生理食塩液 | 90 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 90分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 1000 mL | 点滴静注 | 120分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | | | | | ● | | | | | | | |

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>1W DTX(RT 併用) DTX:d1

1コースの日数： 7日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| ドセタキセル注 5%ブドウ糖液 | 10 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | |

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W PTX(70mg/m² 3投1休) PTX:d1, 8, 15

1コースの日数： 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|-----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | 15 | ... | ... | 28 |
| デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液 | 8.25 mg 20 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | ● | | | |
| ポララミン注 生理食塩液 | 5 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | ● | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | ● | | | |
| パクリタキセル注 5%ブドウ糖液 | 70 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | ● | | ● | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | ● | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 生理食塩液 | 500 mL | | | | | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 注 | 1000 mL | 点滴静注 | 180 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| フィジオ 140 注 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| フルオウラシル注 | 800 mg/m ² | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 1000 mL | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | | | | | | ● | | ● | | | |

* アプレピタントカプセル : Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | |
| フィジオ 140 注 | 1000 mL | 点滴静注 | 180 分 | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| フィジオ 140 注 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | ● | | | | | |
| フルオウラシル注 | 750 mg/m ² | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 生理食塩液 | 1000 mL | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | | | | | | ● | | | | |

* アプレピタントカプセル : Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------|--------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| フィジオ 140 注 | 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | | | | | ● | ● | | | | | |
| フルオウラシル注 生理食塩液 | 800 mg/m ² 1000 mL | 点滴静注 | 24 時間 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | | | | | | ● | | ● | | |

* アプレピタントカプセル : Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>6W オプジーボ/ヤーボイ

1コースの日数：42日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | ... | ... | 15 | ... | ... | 29 | ... | ... | 42 | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | ● | | | ● | | | | |
| オプジーボ注 生理食塩液 | 240 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | ● | | | ● | | | | |
| 生理食塩液 | 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| ヤーボイ注 生理食塩液 | 1 mg/kg 20 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | ● | | | ● | | | | |

