

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（産婦人科）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2023 年 12 月 11 日

○ 更新内容

2023 年 12 月 11 日

・ 頸部>3W リブタヨ療法 を追加しました。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：婦>4W CPT-11/CDDP

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	...	8	...	15	28	
ラクテック G	1000 mL	点滴静注	300 分											
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●		●				
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●								
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	60 mg/m2 250 mL	点滴静注	90 分	●				●		●				
シスプラチン注 生理食塩液	60 mg/m2 1000 mL	点滴静注	180 分	●										
マンニトール注	500 mL	点滴静注	90 分	●										
ラクテック G	1000 mL	点滴静注	240 分	●										
ソルデム 3A	1000 mL	点滴静注	240 分	●	●	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分					●		●				

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：婦>3W dd TC

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分				●				●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●			●				●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●				●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●			●				●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●				●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：婦>3W TC(イメンド)

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	3	21		
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●									
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●											
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●											
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	175 mg/m ² 500 mL	点滴静注	180分	●											
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●											

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：頸部>4W CPT-11/NDP

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	8	28	
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●				●						
イリノテカン注 5%ブドウ糖液	60 mg/m2 500 mL	点滴静注	90分	●				●						
アクプラ注 生理食塩液	80 mg/m2 500 mL	点滴静注	90分	●										
生理食塩液	1000 mL	点滴静注	120分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分					●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：婦>3W BV(90(60)(30)min)+dd TC

1コースの日数： 21日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	...	8	15	21	
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分				●				●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●			●				●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●				●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	60分	●			●				●			
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60分	●										
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分(→60分→30分)	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●				●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名： 卵巣>3W BV (90 (60) (30)min)+TC

1コースの日数： 21日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	21		
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●									
デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 1 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●											
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●											
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	175 mg/m ² 500 mL	点滴静注	180分	●											
カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	AUC 6 250 mL	点滴静注	60分	●											
アバスチン注 生理食塩液	15 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分(→60分→30分)	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●											

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：胚細胞腫瘍>3W BEP

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	...	9	...	16	...	21
ラクテック G	1000 mL	点滴静注	300 分	●	●	●	●	●						
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●										
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	6.6mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●	●	●						
シスプラチン注 生理食塩液	20 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●	●	●						
マンニトール注	500 mL	点滴静注	90 分	●	●	●	●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分							●		●		
ブレオ注 生理食塩液	30 mg 50 mL	点滴静注	5~10 分		●					●		●		
エトポシド注 5%ブドウ糖液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●	●	●						
ラクテック G	1000 mL	点滴静注	240 分	●	●	●	●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●		●		

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

