

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（血液内科：多発性骨髄腫）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2023 年 12 月 5 日

○ 更新内容

2023 年 12 月 5 日

・ 下記レジメンを追加しました。

MM>4W サークリサ/カイゾ®ロリス(1kr) IsaKd

MM>4W サークリサ/カイゾ®ロリス(2kr-) IsaKd

MM>4W サークリサ(1kr) IsaD

MM>4W サークリサ(2kr-) IsaD

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>1W ベルケイド（皮下） 1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
				1	...	4	...	8	...	11	...	...	21
ベルケイド注 生理食塩液	1.3 mg/m <sup>2</sup> 4 mL	皮下注射		●		●		●		●			

・ Vd 療法時 （ベルケイド注に加えて） デキサメタゾン錠 20-40 mg/日 day 1, (2), 4, (5), 8, (9), 11, (12)

・ VRd 療法時 （ベルケイド注に加えて） レブラミドカプセル 25 mg/日 (day 1-14)

デキサメタゾン錠 20-40 mg/日 day 1, (2), 4, (5), 8, (9), 11, (12)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : MM>4W カイプロリス (1kr 週 1 回) Kd : DEXA 併用

1 コースの日数 : 28 日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
				1	...	8		15	...	22	...	...	28
生理食塩液	250mL	点滴静注	30 分	●		●		●					
カイプロリス注 5%ブドウ糖液	20 mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注	10 分	●									
カイプロリス注 5%ブドウ糖液	70 mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	30 分			●		●					
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10 分	●		●		●					
デキサメタゾン錠	40mg			●		●		●		●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : MM>4W カイプロリス (2kr 週 1 回) Kd : DEXA 併用

1 コースの日数 : 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	...	8		15	...	22	...	...	28	
生理食塩液	250mL	点滴静注	30 分	●		●		●						
カイプロリス注 5%ブドウ糖液	70 mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	30 分	●		●		●						
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10 分	●		●		●						
デキサメタゾン錠	40mg			●		●		●		●				

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : MM>4W カイプロリス(1kr 週2回) Kd : DEXA 併用

1コースの日数 : 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day												
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28
生理食塩液	250mL	点滴静注	30分	●	●											
生理食塩液	50mL	点滴静注	15分				●	●		●	●					
カイプロリス 注 5%ブドウ糖液	20 mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注	10分	●	●											
カイプロリス 注 5%ブドウ糖液	56 mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	30分				●	●		●	●					
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10分	●	●		●	●		●	●					
デキサメタゾン錠	40mg			●	●		●	●		●	●		●	●		

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : MM>4W カイプロリス (2kr 週 2 回) Kd : DEXA 併用

1 コースの日数 : 28 日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day												
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●	●		●	●		●	●					
カイプロリス 注 5%ブドウ糖液	56 mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	30 分	●	●		●	●		●	●					
生理食塩液	50mL	点滴静注	5~10 分	●	●		●	●		●	●					
デキサメタゾン錠	40mg			●	●		●	●		●	●		●	●		

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W エムプリシティ/ホマリスト（1,2kr） \*1コースおよび2コース目のみ

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	...	8	...	15	...	22	...	...	28	
デキサメタゾン錠	8mg~28mg	内服	エムプリシティ投与 3~24時間前	●		●		●		●				
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●		●		●		●				
アセトアミノフェン注	500~1000 mg	点滴静注	15分	●		●		●		●				
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15分	●		●		●		●				
生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	●		●		●		●				
エムプリシティ注 生理食塩液	10mg/kg 150mL	点滴静注	(30mL/hr~)	●		●		●		●				
生理食塩液	50mL	点滴静注	20分	●		●		●		●				
ホマリスト	4 mg	内服		Day1~21（3週間服用 1週間休薬）										

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W エムプリシティ/ホマリスト（3kr-） \*3 コース目以降

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	...	8	...	15	...	22	...	...	28	
デキサメタゾン錠	8~28mg	内服	エムプリシティ投与 3~24 時間前	●										
デキサメタゾン錠	20~40mg	内服				●		●		●				
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●										
アセトアミノフェン注	500~1000 mg	点滴静注	15 分	●										
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●										
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●										
エムプリシティ注 生理食塩液	20mg/kg 150~350mL	点滴静注	(300mL/hr~)	●										
生理食塩液	50mL	点滴静注	10 分	●										
ホマリスト	4 mg	内服		Day1~21（3週間服用 1週間休薬）										

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W サークリサ/ポマリスト（1kr）

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	...	8	...	15	...	22	...	...	28
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	39.6 mg★ 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●		●		●			
アヘトアミノフィン注	500～1000 mg	点滴静注	15 分	●		●		●		●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●		●		●		●			
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●		●		●		●			
サークリサ注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴静注	（体重に応じて 流速変更）	●		●		●		●			
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●		●		●		●			
ポマリスト	4 mg	内服		Day1～21（3週間服用 1週間休薬）									

★デキサート注→75歳以上の場合、19.8mgに減量することがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W サークリサ/ポマリスト (2kr-)

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	...	...	...	15	...	...	...	...	28	
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	39.6 mg★ 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●						
アトアミノフィン注	500~1000 mg	点滴静注	15 分	●				●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●				●						
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●				●						
サークリサ注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴静注	(体重に応じて 流速変更)	●				●						
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●				●						
ポマリスト	4 mg	内服		Day1~21 (3週間服用 1週間休薬)										

★デキサート注→75歳以上の場合、19.8mgに減量することがあります。

\* デキサメタゾン錠 が処方されることがあります。(75歳未満→40mg/日 (Day8, Day22)  
(75歳以上→20mg/日 (Day8, Day22))

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W サークリサ/カイトロリス（1kr）IsaKd

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●			●			●			●				
デキサート注 生理食塩液	19.8 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●			●			●						
7αトアマノフェン注	500~1000 mg	点滴静注	15 分	●			●			●			●				
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●			●			●			●				
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●			●			●			●				
サークリサ注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴静注	(体重に応じて流速変更)	●			●			●			●				
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●			●			●							
カイトロリス注 5%ブドウ糖液	20mg /m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	30 分	●	●												
カイトロリス注 5%ブドウ糖液	56mg /m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30 分				●	●		●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分	●	●		●	●		●	●		●				
デキサメタゾン錠	20 mg	内服												●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W サークリサ/カイトロリス（2kr-）IsaKd

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	19.8 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●							●						
デキサート注 生理食塩液	19.8 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●		●	●				●					
7セトアミノフェン注	500~1000 mg	点滴静注	15 分	●							●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●							●						
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●							●						
サークリサ注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴静注	(体重に応じて流速変更)	●							●						
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●							●						
カイトロリス注 5%ブドウ糖液	56mg /m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30 分	●	●		●	●			●	●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分	●	●		●	●			●	●					
デキサメタゾン錠	20 mg	内服													●	●	

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W サークリサ（1kr） IsaD

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	...	8	...	15	...	22	...	...	28
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	39.6 mg★ 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●		●		●			
アヘトアミノフィン注	500～1000 mg	点滴静注	15 分	●		●		●		●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●		●		●		●			
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●		●		●		●			
サークリサ注 生理食塩液	20mg/kg 250mL	点滴静注	（体重に応じて 流速変更）	●		●		●		●			
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●		●		●		●			

★デキサート注→75 歳以上の場合、19.8mg に減量することがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W サークリサ（2kr-） IsaD

1コースの日数： 28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	...	8	...	15	...	22	...	...	28	
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	39.6 mg★ 20 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●				●						
アトアミノフィン注	500～1000 mg	点滴静注	15 分	●				●						
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●				●						
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●				●						
サークリサ注 生理食塩液	20mg/kg 250mL	点滴静注	（体重に応じて 流速変更）	●				●						
生理食塩液	50mL	点滴静注	15 分	●				●						
デキサメタゾン錠	40 mg★	内服				●				●				

★デキサート注、デキサメタゾン錠→75歳以上の場合、19.8mgに減量することがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ(1-2kr) DLd:Len, DEXA 併用 ※未治療の多発性骨髄腫

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	...	...	8	...	...	15	...	...	22	...	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●			●			●			●				
レブラミドカプセル	25 mg/日	経口		● Day1-21 連日内服													
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●			●			●			●				
解熱鎮痛剤		経口		●			●			●			●				
抗ヒスタミン剤		経口		●			●			●			●				

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者、過小体重(BMI:18.5未満)の患者にはデキサメタゾンを20mg/週にすることがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ(3-6kr) DLd:Len, DEXA 併用 ※未治療の多発性骨髄腫

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day													
				1	...	...	8	...	...	15	...	...	22	...	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●							●						
レブラミドカプセル	25 mg/日	経口		● Day1-21 連日内服													
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●			●				●			●			
解熱鎮痛剤		経口		●							●						
抗ヒスタミン剤		経口		●							●						

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者、過小体重(BMI:18.5未満)の患者にはデキサメタゾンを20mg/週にすることがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ(7kr-) DLd:Len, DEXA 併用 ※未治療の多発性骨髄腫

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	...	...	8	...	...	15	...	...	22	...	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●													
レブラミドカプセル	25 mg/日	経口		● Day1-21 連日内服													
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●			●				●				●		
解熱鎮痛剤		経口		●													
抗ヒスタミン剤		経口		●													

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者、過小体重(BMI:18.5未満)の患者にはデキサメタゾンを20mg/週にすることがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ(1-2kr) DLd:Len, DEXA 併用 ※再発又は難治性の多発性骨髄腫

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●			●			●			●				
レブラミドカプセル	25 mg/日	経口		● Day1-21 連日内服													
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●	●		●	●		●	●		●	●			
解熱鎮痛剤		経口		●			●			●			●				
抗ヒスタミン剤		経口		●			●			●			●				

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者、過小体重(BMI:18.5未満)の患者にはデキサメタゾンを20mg/週にすることがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ(3-6kr) DLd:Len, DEXA 併用 ※再発又は難治性の多発性骨髄腫

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●							●						
レブラミドカプセル	25 mg/日	経口		● Day1-21 連日内服													
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●	●		★				●	●		★			
解熱鎮痛剤		経口		●							●						
抗ヒスタミン剤		経口		●							●						

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者、過小体重(BMI:18.5未満)の患者にはデキサメタゾンを20mg/週にすることがあります。

★day8-14のいずれか、day22-28のいずれか

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ(7kr-) DLd:Len, DEXA 併用 ※再発又は難治性の多発性骨髄腫

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●													
レブラミドカプセル	25 mg/日	経口		● Day1-21 連日内服													
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●	●		★				★			★			
解熱鎮痛剤		経口		●													
抗ヒスタミン剤		経口		●													

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者、過小体重(BMI:18.5未満)の患者にはデキサメタゾンを20mg/週にすることがあります。

★day8-14のいずれか、day15-21のいずれか、day22-28のいずれか

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>3W ダラキューロ/ベルケイド (1-3kr) DBd: BOR, DEXA 併用

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day															
				1	2	...	4	5	...	8	9	...	11	12	...	15	...	21	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●							●						●		
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射		●			●				●			●					
デキサメタゾン錠	80 mg/週	経口		●	●		●	●			●	●		●	●		●		
解熱鎮痛剤		経口		●							●						●		
抗ヒスタミン剤		経口		●							●						●		

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える、過小体重(BMI:18.5未満)、コントロール不良の糖尿病、ステロイド療法に対する忍容性はない若しくは有害事象を  
発現した患者にはデキサメタゾンを20mg/週にすることがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>3W ダラキューロ/ベルケイド (4-8kr) DBd: BOR, DEXA 併用

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day															
				1	2	...	4	5	...	8	9	...	11	12	...	...	...	21	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●															
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射		●			●			●			●						
デキサメタゾン錠	80 mg/週	経口		●	●		●	●		●	●		●	●					
解熱鎮痛剤		経口		●															
抗ヒスタミン剤		経口		●															

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える、過小体重(BMI:18.5未満)、コントロール不良の糖尿病、ステロイド療法に対する忍容性はない若しくは有害事象を  
発現した患者にはデキサメタゾンを20mg/週にすることがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ/ベルケイド (9kr-) DBd: BOR, DEXA 併用

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day			
				1	...	...	28
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●			
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射					
デキサメタゾン錠	20 mg	経口		●			
解熱鎮痛剤		経口		●			
抗ヒスタミン剤		経口		●			

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>6W ダラキューロ/MPB(1kr) DMPB: BOR, L-PAM, PSL 併用

1コースの日数： 42日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day															
				1	2	3	4	...	...	8	...	...	11	...	...	15	...	...	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●							●						●		
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射		●			●				●			●					
メルファラン錠	9 mg/m <sup>2</sup>	経口		●	●	●	●												
プレドニゾン錠	60 mg/m <sup>2</sup>	経口			●	●	●												
デキサメタゾン錠	20 mg	経口		●							●							●	
解熱鎮痛剤		経口		●							●							●	
抗ヒスタミン剤		経口		●							●							●	

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day																
				22	...	...	25	...	...	29	...	...	32	...	...	36	...	42		
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●							●							●		
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射		●			●				●			●						
デキサメタゾン錠	80 mg/週	経口		●							●							●		
解熱鎮痛剤		経口		●							●							●		
抗ヒスタミン剤		経口		●							●							●		

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>6W ダラキューロ/MPB(2-9kr) DMPB: BOR, L-PAM, PSL 併用

1コースの日数： 42日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day															
				1	2	3	4	...	8	...	...	22	...	...	29	...	...	42	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●									●						
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射		●						●			●			●			
メルファラン錠	9 mg/m <sup>2</sup>	経口		●	●	●	●												
プレドニゾン錠	60 mg/m <sup>2</sup>	経口			●	●	●												
デキサメタゾン錠	20 mg	経口		●									●						
解熱鎮痛剤		経口		●									●						
抗ヒスタミン剤		経口		●									●						

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ/MPB(10kr-) DMPB: BOR, L-PAM, PSL 併用

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day			
				1	...	...	28
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●			
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注射					
メルファラン錠	9 mg/m <sup>2</sup>	経口					
プレドニゾン錠	60 mg/m <sup>2</sup>	経口					
デキサメタゾン錠	20 mg	経口		●			
解熱鎮痛剤		経口		●			
抗ヒスタミン剤		経口		●			

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ/カイプロリス(1kr) DCd:CaIf, DEXA 併用

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●			●			●			●				
生理食塩液	250 mL	点滴静注	30分	●	●												
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分				●	●		●	●						
カイプロリス注 5%ブドウ糖液	20mg /m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	30分	●	●												
カイプロリス注 5%ブドウ糖液	56mg /m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分				●	●		●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●	●		●	●		●	●						
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●	●		●	●		●	●		●				
解熱鎮痛剤		経口		●			●			●			●				
抗ヒスタミン剤		経口		●			●			●			●				
ロイコトリエン拮抗剤		経口		●			●			●			●				

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者の場合、デキサメタゾンはday1, 2, 8, 15, 22に20mg、day9, 16に8mgを投与します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ/カイプロリス(2kr) DCd:CaIf, DEXA 併用

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●			●			●			●				
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●	●		●	●		●	●						
カイプロリス注 5%ブドウ糖液	56mg /㎡ 100 mL	点滴静注	30分	●	●		●	●		●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●	●		●	●		●	●						
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●	●		●	●		●	●		●				
解熱鎮痛剤		経口		●			●			●			●				
抗ヒスタミン剤		経口		●			●			●			●				
ロイコトリエン拮抗剤		経口		●			●			●			●				

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者の場合、デキサメタゾンはday1, 8, 15, 22に20mgを投与し、20mg/週とすることがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ/カイプロリス(3-6kr) DCd:Cal f, DEXA 併用

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●							●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●	●		●	●			●	●					
カイプロリス注 5%ブドウ糖液	56mg /m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●	●		●	●			●	●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●	●		●	●			●	●					
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●	●		●	●			●	●		●			
解熱鎮痛剤		経口		●							●						
抗ヒスタミン剤		経口		●							●						
ロイコトリエン拮抗剤		経口		●							●						

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者の場合、デキサメタゾンはday1, 15, 22に20mg、day8に12mg、day9に8mgを投与し、20mg/週とすることがあります。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：MM>4W ダラキューロ/カイプロリス(7kr-) DCd:Cal f, DEXA 併用

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day													
				1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	...	28	
ダラキューロ配合皮下注	1800 mg	皮下注射	3~5分	●													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●	●		●	●		●	●						
カイプロリス注 5%ブドウ糖液	56mg /m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●	●		●	●		●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●	●		●	●		●	●						
デキサメタゾン錠	40 mg/週	経口		●	●		●	●		●	●		●				
解熱鎮痛剤		経口		●													
抗ヒスタミン剤		経口		●													
ロイコトリエン拮抗剤		経口		●													

※デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤はダラキューロ投与の1~3時間前に内服します。

※75歳を超える患者の場合、デキサメタゾンはday1, 22に20mg、day8, 15に12mg、day9, 16に8mgを投与し、20mg/週とすることがあります。