静岡県立総合病院　化学療法レジメン（血液内科：リンパ腫）

★　レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

●　最終更新日 2023 年 12 月 5 日

○　更新内容

2024 年 11 月 25 日

下記ﾚｼﾞﾒﾝを追加しました。

・ﾘﾝﾊﾟ腫>1W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(0.16mg:1kr,初回)

・ﾘﾝﾊﾟ腫>1W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(0.8mg:1kr,2 回目)

・ﾘﾝﾊﾟ腫>1W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(48mg:1kr,3 回目以降)

・ﾘﾝﾊﾟ腫>4W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(2-3kr)

・ﾘﾝﾊﾟ腫>4W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(4-9kr)

・ﾘﾝﾊﾟ腫>4W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(10kr-)

2023 年 12 月 5 日

・ﾘﾝﾊﾟ腫>3W ﾀﾞﾙﾋﾞｱｽ　を追加しました。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞2W アドセトリス/AVD
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	14
デキサート注 グラニセトロン注 アロカリス注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 235 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
ドキソルビシン注 生理食塩液	25 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
エグザール注 生理食塩液	6mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
ダカルバジン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	120 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
アドセトリス注 生理食塩液	1.2 mg/kg 75 mL	点滴静注	30 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
ジーラスタ注	3.6mg	皮下注射			●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W アドセトリス
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	21
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
アドセトリス注 生理食塩液	1.8 mg/kg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞2W　ABVD
１コースの日数：　14 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	14
ソル・コーテフ注 グラニセトロン注 アロカリス注 生理食塩液	100 mg 1 mg 235 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
ドキソルビシン注 生理食塩液	25 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
ブレオ注 生理食塩液	10 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
エグザール注 生理食塩液	6 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●						
ダカルバジン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	120 分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞4W C-MOPP
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day								
				1	・・・	・・・	8	・・・	・・・	・・・	・・・	28
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●			●					
オンコビン注 生理食塩液	1.4 mg/㎡ 50mL	点滴静注	5～10 分	●			●					
エンドキサン注 生理食塩液	650 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	120 分	●			●					
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●			●					
塩酸プロカルバジン	100 mg/㎡	内服		day1～14（2 週間服用　2 週間休薬）								
プレドニゾロン錠	40 mg/㎡	内服		day1～14（2 週間服用　2 週間休薬）								

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞1W R単独
１コースの日数：　７日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	7
アタラックスＰ注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	25mL/hr～	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞1W [rapid]R 単独(2kr-)
１コースの日数：　７日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	7
アタラックスＰ注 ソル・コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●						
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30 分後、200mL/h に速度 up	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●						

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W R-CHOP(2kr-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30 分後、200mL/h に速度 up	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●									
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
オンコビン注 生理食塩液	1.4mg/㎡ 100mL	点滴静注	5～10 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	50 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/㎡ 500mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W R-CHOP(VCR→VDS)(2kr-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30 分後、200mL/h に速度 up	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●									
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
フィルデシン注 生理食塩液	2 mg/㎡ 50mL	点滴静注	5～10 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	50 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/㎡ 500mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W R-THP-CVP(2kr-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30 分後、200mL/h に速度 up	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●									
プレドニン注 生理食塩液	40 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
フィルデシン注 生理食塩液	1.5 mg/㎡ 50mL	点滴静注	5～10 分	●									
ピラルビシン注 5%ブドウ糖液	30 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	500mg/㎡ 500mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W G-CHOP(2kr-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ注	1000 mg	点滴静注	15 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	100mL	点滴静注	30 分	●									
ガザイバ注 生理食塩液	1000 mg 250 mL	点滴静注	25mL/hr で開始 30 分後、225mL/h に速度 up	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●									
オンコビン注 生理食塩液	1.4mg/㎡ 100mL	点滴静注	5～10 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	50 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/㎡ 500mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W トレアキシン
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	21
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	125-80-80mg	内服		●	●	●							
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●								
トレアキシン注 生理食塩液	120 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	10 分	●	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●								

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞4W R-トレアキシン(初)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	28
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	125-80-80mg	内服			●	●	●						
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	(25mL/h～)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
トレアキシン注 生理食塩液	90 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	10 分		●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分		●	●							

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞4W R-トレアキシン(2kr-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	28
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	125-80-80mg	内服		●	●	●							
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30 分後、200mL/h に速度 up	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●								
トレアキシン注 生理食塩液	90 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	10 分	●	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●								

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W R-MECP(2kr-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30 分後、200mL/h に速度 up	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●									
ノバントロン注 生理食塩液	8 mg/㎡ 100mL	点滴静注	30 分	●									
カルボプラチン注 ５％ブドウ糖液	300 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
ラステットＳ	100mg/body MAX 140mg/㎡	内服		●	●	●	●	●					
プレドニン錠	40mg/㎡	内服		●	●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞4W G-トレアキシン(初)
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	･･･	8	･･･	15	･･･	28
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	125-80-80mg	内服			●	●	●						
デキサート注 生理食塩液	19.8 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●					●		●		
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ注	1000 mg	点滴静注	15 分	●					●		●		
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●					●		●		
生理食塩液	100mL	点滴静注	30 分	●					●		●		
ガザイバ注 生理食塩液	1000 mg 250 mL	点滴静注	12 mL/hr～	●					●		●		
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
トレアキシン注 生理食塩液	90 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	10 分		●	●							
生理食塩液	50mL	点滴静注	30 分	●					●		●		
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分		●	●							

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞4W G-トレアキシン(2kr-)
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	28
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	125-80-80mg	内服		●	●	●							
デキサート注 生理食塩液	19.8 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ注	1000 mg	点滴静注	15 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	100mL	点滴静注	30 分	●									
ガザイバ注 生理食塩液	1000 mg 250 mL	点滴静注	25mL/hr で開始 30 分後、225mL/h に速度 up	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	30 分	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●								
トレアキシン注 生理食塩液	90 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	10 分	●	●								
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●	●								

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞8W G 単独
１コースの日数：　56 日　（維持療法として）

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	・・・	56
デキサート注 生理食塩液	19.8 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ注	1000 mg	点滴静注	15 分	●									
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50mL	点滴静注	15 分	●									
生理食塩液	100mL	点滴静注	30 分	●									
ガザイバ注 生理食塩液	1000 mg 250 mL	点滴静注	25mL/hr で開始 30 分後、225mL/h に速度 up	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	30 分	●									

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W Pola/R-CHP(2kr-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 250mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30 分後、200mL/h に速度 up	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●									
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
ポライビー点滴静注 生理食塩液	1.8mg/kg 50mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	50 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/㎡ 500mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W Pola(90min/30min)+CHP
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●									
ポライビー点滴静注 生理食塩液	1.8mg/kg 50mL	点滴静注	初回 90 分 2 コース目以降は 30 分	●									
生理食塩液	100mL or 50 mL	点滴静注	30 分 or 15 分	●									
プレドニン注 生理食塩液	100 mg 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	50 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/㎡ 500mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞4W THP-COP
１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	28
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100mL	点滴静注	30 分	●									
プレドニン注 生理食塩液	100 mg/body 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
オンコビン注 生理食塩液	1.4 mg/㎡ 50mL	点滴静注	5～10 分	●									
ピノルビン注 5%ブドウ糖液	50 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	750mg/㎡ 500mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50mL	点滴静注	5～10 分	●									
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W Pola+BR(初)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	125-80-80mg	内服			●	●	●						
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●								
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	(25mL/h～)	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●							
ポライビー注 生理食塩液	1.8 mg/kg 50 mL	点滴静注	90 分		●								
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分		●								
トレアキシン注 生理食塩液	90 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	10 分		●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分		●	●							

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W Pola+BR(2kr-)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ	125-80-80mg	内服		●	●	●							
アタラックスＰ注 ソル･コーテフ注 生理食塩液	50 mg 100 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●								
リツキサン注 生理食塩液	375 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	100mL/hr で開始 30 分後、200mL/h に速度 up	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●								
ポライビー注 生理食塩液	1.8 mg/kg 50 mL	点滴静注	30 分		●								
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30 分		●								
トレアキシン注 生理食塩液	90 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	10 分	●	●								
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●								

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W A+CHP(MAX 8ｺｰｽ)
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	･･･	･･･	･･･	･･･	21
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
プレドニン注 生理食塩液	100 mg/body 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
ドキソルビシン注 生理食塩液	50 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
エンドキサン注 生理食塩液	750 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	120 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
アドセトリス注 生理食塩液	1.8 mg/kg 100 mL	点滴静注	30 分	●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●									
プレドニゾロン錠	100mg/日	内服			●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：リンパ腫＞3W ダルビアス
１コースの日数：　21 日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	4	5	・・・	・・・	・・・	・・・	21
グラニセトロン注 生理食塩液	1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●	●	●	●	●					
ダルビアス点滴静注 生理食塩液	300 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	60 分	●	●	●	●	●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分	●	●	●	●	●					

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：・ﾘﾝﾊﾟ腫>1W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(0.16mg:1kr,初回)
・ﾘﾝﾊﾟ腫>1W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(0.8mg:1kr,2回目)
・ﾘﾝﾊﾟ腫>1W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(48mg:1kr,3回目以降)

１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	Day											
			1	･･･	･･･	8	･･･	･･･	15	･･･	･･･	22	･･･	28
副腎皮質ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 解熱鎮痛剤		内服	★			★			★			★		
エプキンリ	0.16 mg	皮下注射	●											
	0.8 mg					●								
	48 mg								●			●		

※前投薬(★)はエプキンリ投与30～120分前に投与します。
　エプキンリ投与翌日、2日目、3日目は副腎皮質ホルモン剤のみ投与します（副腎皮質ホルモン剤の投与は合計4日間)。

※1サイクル目の各投与は原則入院で実施します。少なくとも1サイクル目のエプキンリ48mg初回投与後48時間は必ず入院管理です。

静岡県立総合病院　化学療法レジメン

レジメン名：ﾘﾝﾊﾟ腫>4W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(2-3kr)

１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	Day											
			1	･･･	･･･	8	･･･	･･･	15	･･･	･･･	22	･･･	28
副腎皮質ホルモン剤		内服	★			★			★			★		
エプキンリ	48 mg	皮下注射	●			●			●			●		

レジメン名：ﾘﾝﾊﾟ腫>4W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(4-9kr)

１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	Day											
			1	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	15	･･･	･･･	･･･	･･･	28
副腎皮質ホルモン剤		内服	★						★					
エプキンリ	48 mg	皮下注射	●						●					

レジメン名：ﾘﾝﾊﾟ腫>4W ｴﾌﾟｷﾝﾘ(10kr-)

１コースの日数：　28 日

薬品名	標準的投与量	投与法	Day											
			1	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	･･･	28
副腎皮質ホルモン剤		内服	★											
エプキンリ	48 mg	皮下注射	●											

※前回のエプキンリ投与後に Grade2 または 3 の CRS があらわれた場合は、エプキンリ投与後に Grade2 以上の CRS があらわれなくなるまで
　エプキンリ投与 30～120 分前、投与翌日、2 日目、3 日目に副腎皮質ホルモン剤(★)を投与します（合計 4 日間)。