

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（泌尿器科）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2022 年 12 月 10 日

○更新内容

2022 年 12 月 10 日

・尿路上皮＞4W パドセブ療法を追加しました。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：尿路上皮>4W GC 1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	...	8	...	15	...	...	28	
ソリューゲン G	500 mL	点滴静注	90 分		●										
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服			●	●	●								
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分	●		●				●		●			
デキサート注 アロキシ注 生理食塩液	9.9mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●										
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分	●						●		●			
ソリューゲン G 硫酸 Mg 補正液	500 mL 10 mEq	点滴静注	90 分		●										
シスプラチン注 生理食塩液	70 mg/m2 1000 mL	点滴静注	180 分		●										
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●										
ラクテック G	2000 mL	点滴静注	360 分	●											
ソリューゲン G	2000 mL	点滴静注	360 分		●										
ソリューゲン G	1500 mL	点滴静注	300 分			●									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●		●			

・アプレピタントカプセル：Day2 は治療前、Day3~4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：尿路上皮>3W GC(CDDP 分割) 1コースの日数： 21 日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	...	...	9	...	...	21	
ラクテック G	2000 mL	点滴静注	360 分	●										
ラクテック G	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●								
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服			●	●	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●								
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30 分				●			●				
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m2 100 mL	点滴静注	30 分		●					●				
シスプラチン注 生理食塩液	35 mg/m2 1000 mL	点滴静注	180 分		●	●								
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●	●								
ソリューゲン G	2000 mL	点滴静注	360 分		●	●								
ソリューゲン G	1500 mL	点滴静注	300 分				●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●				

・アプレピタントカプセル：Day2 は治療前、Day3~4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：尿路上皮>4W パドセブ

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day								
				1	2	3	...	8	...	15	...	28
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30分	●				●		●		
パドセブ注 生理食塩液	1.25 mg/kg 50 mL	点滴静注	30分	●				●		●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●				●		●		

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：尿路上皮>3W キイトルーダ

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	...	...	...	...	...	...	...	...	21	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●											
キイトルーダ注	200 mg	点滴静注	30分	●											
生理食塩液	50 mL														
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●											

\* 腎細胞がんに対しては、インライタ錠（開始用量として）5mgを1日2回連日服用）を併用します。





静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：精巣>3W BEP

1コースの日数： 21 日

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	...	9	...	16	...	21
ソルデム3A 生理食塩液	500 mL 500 mL	点滴静注	180 分	●	●	●	●	●						
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服		●	●	●								
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分	●										
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	6.6mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30 分		●	●	●	●						
ソル・コーテフ注 生理食塩液	100 mg 100 mL	点滴静注	30 分							●		●		
ブレオ注 生理食塩液	30 mg 50 mL	点滴静注	5～10 分		●					●		●		
エトポシド注 生理食塩液	100 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●	●	●						
シスプラチン注 生理食塩液	20 mg/m2 500 mL	点滴静注	120 分	●	●	●	●	●						
マンニトール注	500 mL	点滴静注	90 分	●	●	●	●	●						
ソルデム3A 生理食塩液	1000 mL 1000 mL	点滴静注	360 分	●	●	●	●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5～10 分							●		●		







静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：腎>3W オプジーボ(240 mg/body)/ヤーボイ（4コースまで）

1コースの日数：21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	...	...	...	...	...	...	...	21	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●										
オプジーボ注 生理食塩液	240 mg 50 mL	点滴静注	30分	●										
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30分	●										
ヤーボイ注 生理食塩液	1 mg/kg 20 mL	点滴静注	30分	●										
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●										

\* ヤーボイ注は原則4コースまでです。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：腎>2W バベンチオ

1コースの日数：14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	...	...	...	...	...	...	...	...	14	
アセアミノフェン注	1000 mg (★)	点滴静注	15分	●											
ポララミン注	5 mg	点滴静注	15分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●											
バベンチオ注	10 mg/kg	点滴静注	60分	●											
生理食塩液	250 mL														
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●											
インライタ錠		内服		(開始用量として) 5 mgを1日2回連日服用											

★ アセアミノフェン注→体重により、用量を調節することがあります。