

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（呼吸器センター）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2022 年 12 月 10 日

○ 更新内容

2022 年 12 月 10 日

- ・ナベルピン、アリムタ、アロキシをそれぞれロゼウス、ペメトレキセド、パロノセトロンに変更しました。

2021 年 12 月 1 日

- ・ NSCLC>3W テセントリク+CDDP/PEM 療法を追加しました。
- ・ NSCLC>3W テセントリク+CBDCA/PEM 療法を追加しました。
- ・ NSCLC>3W オプジーボ/BV+CBDCA/PTX 療法 を追加しました。
- ・ NSCLC>3W オプジーボ/BV 療法 を追加しました。
- ・ 中皮腫>6W オプジーボ/ヤーボイ療法 を追加しました。

2021 年 1 月 5 日

- ・ NSCLC> NSCLC>2W RAM/Erlotinib 療法 を追加しました。
- ・ NSCLC> 6W オプジーボ/ヤーボイ療法 を追加しました。
- ・ NSCLC> 6W オプジーボ/ヤーボイ+CDDP/PEM 療法 を追加しました。
- ・ NSCLC> 6W オプジーボ/ヤーボイ+CBDCA/PEM 療法 を追加しました。
- ・ NSCLC> 6W オプジーボ/ヤーボイ+CBDCA/PTX 療法 を追加しました。
- ・ SCLC> 3W イミフィンジ (BW>30kg)+CDDP/VP-16 療法 を追加しました。
- ・ SCLC> 3W イミフィンジ (BW>30kg) /CBDCA+VP-16 (100mg/m²) (高齢者 80mg/m²) 療法 を追加しました。

NSCLC

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>1W PTX/CBDCA

1コースの日数： 7日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | | | | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | |
| デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| ポララミン注 生理食塩液 | 5 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| パクリタキセル注 5%ブドウ糖液 | 45 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 2 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | |

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>4W PTX/CBDCA

1コースの日数： 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | 15 | ... | ... | 28 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 20 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液 | 8.25 mg 20 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | ● | | ● | | | | |
| ポララミン注 生理食塩液 | 5 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| パクリタキセル注 5%ブドウ糖液 | 70 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W PTX/CBDCA (AUC6)

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液 | 19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ポララミン注 生理食塩液 | 5 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パクリタキセル注 5%ブドウ糖液 | 200 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 180分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W アブラキサン/CBDCA

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | 15 | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | ● | | ● | | | | |
| アブラキサン注 生理食塩液 | 100 mg/m ² (0 mL) | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W PEM/CBDCA

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A注 | 200 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W PEM/CBDCA(高齢者用：AUC5)

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A注 | 200 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W VNR/CBDCA

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | | | | | | | ● | | | | |
| ロゼウス注 生理食塩液 | 25 mg/m2 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | ● | | | | |
| 生理食塩液 | 250 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | ● | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 4 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W GEM/CBDCA

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | | | ● | | | | |
| ジェムザール注 5%ブドウ糖液 | 1000 mg/m2 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | ● | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | ● | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W DTX/CBDCA

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ドセタキセル注 5%ブドウ糖液 | 60 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W S-1/CBDCA

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|-----|-----|----|----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | 14 | 15 | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | |
| エスワン | * 下記参照 | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |

- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。
 - ・エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。
- (*エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m²未満：80mg/日, 1.25m²以上 1.5m²未満：100mg/日, 1.5m²以上：120mg/日)



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W CDDP/GEM

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------|--------------|--------|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | | | ● | | | | | | |
| ジェムザール注 5%ブドウ糖液 | 1000 mg/m ² 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 生理食塩液 | 500 mL 500 mL | 点滴静注 | 45 分 60 分 | ● ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | | | | ● | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W GDDP/VNR

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|--------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15 分 | | | | | ● | | | | | | |
| ロゼウス注 生理食塩液 | 25 mg/m2 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 80 mg/m2 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 45 分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250 mL | 点滴静注 | 30 分 | | | | | ● | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W PEM/CDDP

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10 分 | ● | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A | 200 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 75 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 45 分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W PEM

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W BV(90(60)(30)min)+PTX/CBDCA

1コースの日数： 21日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|---------------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液 | 19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ポララミン注 生理食塩液 | 5 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パクリタキセル注 5%ブドウ糖液 | 200 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 180分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| アバスチン注 生理食塩液 | 15 mg/kg 100 mL | 点滴静注 | 90分(→60分→30分) | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W BV(90(60)(30)min)+PEM/CBDCA

1コースの日数： 21日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A | 200 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| アバスチン注 生理食塩液 | 15 mg/kg 100 mL | 点滴静注 | 90分(→60分→30分) | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W BV(90(60)(30)min)+PEM

1コースの日数： 21日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------|---------------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| アバスチン注 生理食塩液 | 15 mg/kg 100 mL | 点滴静注 | 90分(→60分→30分) | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W BV(90(60)(30)min)+アブラキサン

1コースの日数： 21日

* アバスチン注（忍容性があれば、90分→60分→30分 と時間短縮することができる）

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|----|
| | | | | 1 | 2 | ... | 8 | 9 | ... | 15 | 16 | ... | 21 |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | ● | | | ● | | | |
| アブラキサン注 生理食塩液 | 100 mg/m ² (0 mL) | 点滴静注 | 30分 | ● | | | ● | | | ● | | | |
| アバスチン注 生理食塩液 | 15 mg/kg 100 mL | 点滴静注 | 90分(→60分→30分) | ● | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | ● | | | ● | | | |

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>2W RAM/Erlotinib

1コースの日数： 14日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------|-------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| ポララミン注 生理食塩液 | 5 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | |
| サイラムザ注 生理食塩液 | 10 mg/kg 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | |
| エルロチニブ錠* | 150 mg | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

* 原則 エルロチニブ錠を用いますが、ゲフィチニブ錠を使用することもできます。

(引用文献：Lancet Oncol 2019；20：1655-69)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン レジメン名：NSCLC>3W ポートラーザ + GEM/CDDP (Sq)

1コースの日数： 21日 ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2～3は午前中に内服します。

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5～10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | ● | | | | | | | |
| ポートラーザ注 生理食塩液 | 800 mg 200 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | ● | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5～10分 | ● | | | | ● | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ジェムザール注 5%ブドウ糖液 | 1250 mg/m2 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 75 mg/m2 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 45分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5～10分 | | | | | ● | | | | | | | |



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>6W オプジーボ／ヤーボイ

1コースの日数： 42日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 22 | ... | ... | ... | 42 | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | ● | | | | |
| オプジーボ注 生理食塩液 | 360 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | ● | | | | |
| 生理食塩液 | 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| ヤーボイ注 生理食塩液 | 1 mg/kg 20 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | ● | | | | |

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>6W オプジーボ／ヤーボイ+CDDP/PEM

1コースの日数： 42日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|------|-----|---|---|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 22 | 23 | 24 | ... | ... | 42 |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | | | | |
| オプジーボ注 生理食塩液 | 360 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | |
| 生理食塩液 | 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | |
| ヤーボイ注 生理食塩液 | 1 mg/kg 20 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | ● | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | ● | | | | | |
| ソルデム3A | 200 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 75 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | ● | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 45分 | ● | | | | ● | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | ● | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|--------|------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- ・ アプレピタントカプセル：Day1（22）は治療前、Day2～3（23～24）は午前中に内服します。
- ・ パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>6W オプジーボ／ヤーボイ+CBDCA/PEM

1コースの日数： 42日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|----|----|----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 22 | 23 | 24 | ... | ... | 42 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| オプジーボ注 生理食塩液 | 360 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| ヤーボイ注 生理食塩液 | 1 mg/kg 20 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m2 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| ソルデム3A | 200 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

・アプレピタントカプセル：Day1（22）は治療前、Day2～3（23～24）は午前中に内服します。

- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>6W オプジーボ／ヤーボイ+CBDCA/PTX

1コースの日数： 42日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 22 | 23 | 24 | ... | ... | 42 |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | | | | |
| オプジーボ注 生理食塩液 | 360 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | |
| 生理食塩液 | 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | |
| ヤーボイ注 生理食塩液 | 1 mg/kg 20 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液 | 19.8mg 0.75 mg 20 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | | | | |
| ポララミン注 生理食塩液 | 5 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | | | | | |
| パクリタキセル注 5%ブドウ糖液 | 200 mg/m2 500 mL | 点滴静注 | 180分 | ● | | | | ● | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | ● | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | ● | | | | ● | | | | | |
|-------|-------|------|--------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

・アプレピタントカプセル：Day1（22）は治療前、Day2~3（23~24）は午前中に内服します。

- ・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W キイトルーダ+CBDCA/PEM(non-Sq) 1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| キイトルーダ注 生理食塩液 | 200 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A注 | 200 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W キイトルーダ+CBDCA/PTX(Sq)

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| キイトルーダ注 生理食塩液 | 200 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 ファモチジン注 生理食塩液 | 19.8 mg 0.75 mg 20 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ポララミン注 生理食塩液 | 5 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パクリタキセル注 5%ブドウ糖液 | 200 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 180分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W キイトルーダ+CBDCA／アブラキサン(Sq)

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | 15 | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | |
| キイトルーダ注 生理食塩液 | 200 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | ● | | ● | | | | |
| アブラキサン注 生理食塩液 | 100 mg/m2 (0 mL) | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W テセントリク (60 (30)min)+CBDCA/アブラキサン (non-Sq)

1コースの日数： 21日 * テセントリク注 (忍容性があれば、60分→30分 と時間短縮可能)

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|---------------|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | 15 | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | |
| テセントリク注 生理食塩液 | 1200 mg 250 mL | 点滴静注 | 60分 (→30分) | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | ● | | ● | | | | |
| アブラキサン注 生理食塩液 | 100 mg/m2 (0 mL) | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W テセントリク (60 (30)min)+GDDP/PEM

1 コースの日数： 21 日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|---------------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| テセントリク注 生理食塩液 | 1200 mg 250 mL | 点滴静注 | 60 分 →30 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m2 50 mL | 点滴静注 | 10 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A | 200 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 75 mg/m2 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 45 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。

・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。

- ・ビタミン B12 注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：NSCLC>3W テセントリク (60 (30)min)+CBDCA/PEM

1 コースの日数： 21 日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|---------------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| テセントリク注 生理食塩液 | 1200 mg 250 mL | 点滴静注 | 60 分 →30 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m2 50 mL | 点滴静注 | 10 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A | 200 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 6 250 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミン B12 注 (1g/回)：ペメトレキセド注投与開始 7 日前から投与中止後 2 2 日まで約 9 週毎に 1 回投与する。

SCLC

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : SCLG>3W CDDP/VP-16 1コースの日数 : 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|--------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | | ● | ● | | | | | | | | |
| エトポシド注 5%ブドウ糖液 | 100 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120 分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 生理食塩液 | 500 mL 500 mL | 点滴静注 | 45 分 60 分 | ● ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | ● | ● | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : SCLG>3W CBDCA/VP-16 (100mg/m²)

1コースの日数 : 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | |
| エトポシド注 5%ブドウ糖液 | 100 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : SCLG>3W CBDCA/VP-16 (80mg/m²:高齢)

1コースの日数 : 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | |
| エトポシド注 5%ブドウ糖液 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : SCLG>4W CBDCA/GPT-11

1コースの日数 : 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | 15 | ... | ... | 28 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | ● | | ● | | | | |
| イリノテカン注 5%ブドウ糖液 | 50 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 90分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLG>4W CDDP/GPT-11

1コースの日数： 28日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|--------|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | 15 | ... | ... | 28 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| イリノテカン注 5%ブドウ糖液 | 60 mg/m2 250 mL | 点滴静注 | 90 分 | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 60 mg/m2 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 45 分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10 分 | | | | | ● | | ● | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : SCLC>3W NGT

1コースの日数 : 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| ハイカムチン注 生理食塩液 | 1 mg/m ² 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLC>1W CPT-11

1コースの日数： 7日

(* 原則として、3週(1週おきに3回)投薬後、翌週休薬)

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | | | | 1 | 2 | ... | ... | ... | ... | 7 | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9 mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| イリノテカン注 5%ブドウ糖液 | 100 mg/m2 500 mL | 点滴静注 | 90分 | ● | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | |



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLG>3W テセントリク（60（30）min）+CBDCA/VP-16(100mg/m²)

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | |
| テセントリク注 生理食塩液 | 1200 mg 250 mL | 点滴静注 | 60分 (→30分) | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | |
| エトポシド注 5%ブドウ糖液 | 100 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : SCLG>3W テセントリク (60 (30) min) +CBDCA/VP-16 (80mg/m²:高齢)

1コースの日数 : 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | |
| テセントリク注 生理食塩液 | 1200 mg 250 mL | 点滴静注 | 60分 (→30分) | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | |
| エトポシド注 5%ブドウ糖液 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：SCLG>3W イミフィンジ(BW>30kg)+CDDP/VP-16 1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | |
| イミフィンジ注 生理食塩液 | 1500 mg 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 硫酸Mg補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 6.6mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | |
| エトポシド注 5%ブドウ糖液 | 100 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120分 | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 45分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | | ● | ● | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名 : SCLC>3W イミフィンジ (BW>30kg) +CBDCA/VP-16 (100mg/m²) or (高齢者 80mg/m²)

1コースの日数 : 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | |
| イミフィンジ注 生理食塩液 | 1500 mg 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95 mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 生理食塩液 | 3.3 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | | |
| エトポシド注 5%ブドウ糖液 | 80-100 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120分 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |

・アプレピタントカプセル : Day1 は治療前、Day2~3 は午前中に内服します。

恶性胸膜中皮腫

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫>3W PEM/GDDP

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 硫酸 Mg 補正液 生理食塩液 | 20 mEq 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液 | 9.9mg 1 mg 100 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A | 200 mL | 点滴静注 | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン注 生理食塩液 | 75 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| マンニトール注 | 500 mL | 点滴静注 | 45 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500 mL | 点滴静注 | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・アプレピタントカプセル：Day1 は治療前、Day2～3 は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫>3W PEM/GBDCA

1コースの日数： 21日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | |
| アプレピタントカプセル | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | 内服 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| デキサート注 パロノセトロン注 生理食塩液 | 4.95mg 0.75 mg 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ペメトレキセド注 生理食塩液 | 500 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A | 200 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250 mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 0.5g | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ・アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。
- ・パンビタン末：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで可能な限り投与する。
- ・ビタミンB12注（1g/回）：ペメトレキセド注投与開始7日前から投与中止後22日まで約9週毎に1回投与する。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：中皮腫>6W オプジーボ/ヤーボイ

1コースの日数： 42日

| 薬品名 | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------|-------|-----|---|---|---|-----|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 22 | ... | ... | ... | 42 | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | ● | | | | |
| オプジーボ注 生理食塩液 | 360 mg 50 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | ● | | | | |
| 生理食塩液 | 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| ヤーボイ注 生理食塩液 | 1 mg/kg 20 mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 5~10分 | ● | | | | | | ● | | | | |