

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（消化器内科・腫瘍内科：膵胆肝）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2023 年 12 月 11 日

#### ○更新内容

2023 年 12 月 11 日

- ・膵胆>3W イミフィンジ（BW>30kg）+GEM/CDDP（8 コースまで）療法を追加しました。
- ・膵胆>4W イミフィンジ（BW>30kg）療法を追加しました。
- ・肝>4W イジユド/イミフィンジ（BW>30kg、初回のみ）療法を追加しました。
- ・肝>4W イミフィンジ（BW>30kg）療法を追加しました。

2022 年 12 月 10 日

消化器内科・腫瘍内科ファイルを臓器別に分けました。

- ・膵胆>2W modified FOLFIRINOX 療法を追加、膵胆>2W オニバイド/FU 療法を修正しました。
- ・アロキシ、プロイメンドをそれぞれパロノセトロン、アロカリスに変更しました。

2020 年 12 月 10 日

- ・肝>3W テセントリク (60min)/BV (90min), 肝>3W テセントリク (30min)/BV (60min), 肝>3W テセントリク (30min)/BV (30min) 療法 を追加しました。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：膵胆>1W GEM(化療単独) GEM:d1 1コースの日数：(下記参照)

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	...	...	...	7	
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							

- ・ジェムザール注(単独療法)→原則 3週間投薬(1週ごと3回投薬)を行い、1週間休薬
- ・エスワン配合錠(カプセル)との併用療法：膵がん【術前療法(ジェムザール+エスワン併用療法)の場合】  
 ジェムザール注→原則 2週間投薬(Day1, Day8; 1週ごと2回投薬)を行い、1週間休薬(Day21まで休薬)  
 エスワン→原則、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。(以後7日間休薬)  
 エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m<sup>2</sup>未満：80mg/日, 1.25m<sup>2</sup>以上 1.5m<sup>2</sup>未満：100mg/日,  
 1.5m<sup>2</sup>以上：120mg/日
- ・エスワン配合錠(カプセル)との併用療法：胆道がん(転移・再発の場合)  
 ジェムザール注→原則 2週間投薬(Day1, Day8; 1週ごと2回投薬)を行い、1週間休薬(Day21まで休薬)  
 エスワン→原則、Day1(夕食後)からDay15(朝食後)まで服用します。(以後7日間休薬)  
 エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m<sup>2</sup>未満：60mg/日, 1.25m<sup>2</sup>以上 1.5m<sup>2</sup>未満：80mg/日,  
 1.5m<sup>2</sup>以上：100mg/日

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：臍胆>1W GEM(放治併用) GEM:d1(3投1休)

1コースの日数： \*\*日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	...	8	...	15	...	21			
デキサート注 生理食塩液	6.6mg 100 mL	点滴静注	30分	●					●				●		
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	300 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●					●				●		
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●					●				●		

・ジェムザール注（単独療法）→原則 3週間投薬（1週ごと3回投薬）を行い、1週間休薬

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名： 麟胆>1W CDDP CDDP:d1

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	...	...	7	
デキサート注 グラネトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						
シスプラチン注 生理食塩液	10~30 mg/ body 500 mL	点滴静注	90分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：臍胆>3W GEM/CDDP GEM, CDDP:d1, d8

1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	...	8	...	...	...	21	
デキサート注 グラネトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●		●					
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●		●					
シスプラチン注 生理食塩液	25 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	●		●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●		●					





静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名： 臍胆>4W アブラキサン/GEM nabPTX, GEM:d1, 8, 15

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	15	...	...	28
デキサート注 グラネトロン注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●				●		●			
アブラキサン注 生理食塩液	125 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●				●		●			
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●				●		●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●				●		●			



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：臍胆>2W GEM/CDDP/S-1 GEM, CDDP:d1/S-1:1 投1休

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	...	8	...	...	14	
デキサート注 グラネトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●							
シスプラチン注 生理食塩液	25 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							
エスワン	●下記参照	内服		●	●	●	●				

● エスワン配合錠（カプセル）は、Day1(夕食後)から Day8(朝食後)まで服用します。

(エスワン標準的投与量(テガフル相当量)→1.25m<sup>2</sup>未満：80mg/日, 1.25m<sup>2</sup>以上 1.5m<sup>2</sup>未満：100mg/日, 1.5m<sup>2</sup>以上：120mg/日)

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：臍胆>2W オニバイド/FU naI-IRI, FU:d1

1コースの日数： 14日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day						
				1	2	3	...	...	...	14
アプレピタントカプセル	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	内服	*	●	●	●				
デキサート注 パロセトロン注 生理食塩液	4.95 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分	●						
オニバイド注 5%ブドウ糖液	70 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	●						
レボホリナート注 生理食塩液	200 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120分	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●						
フルオウラシル注 生理食塩液	2400 mg/m <sup>2</sup> 20 mL	点滴静注	46時間	●						
ハリンNaシリンジ	1筒			●						

\* アプレピタントカプセル：Day1は治療前、Day2~3は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：臍胆>3W イミフィンジ (BW>30kg) +GEM/CDDP (8 コースまで) デュルバルマブ:d1/GEM, CDDP:d1, 8  
 1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	...	8	...	...	...	21	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg/body 250 mL	点滴静注	60分	●							
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	6.6 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●		●					
ジェムザール注 5%ブドウ糖液	1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	●		●					
シスプラチン注 生理食塩液	25 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	●		●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●		●					

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：臍胆>4W イミフィンジ (BW>30kg) デュルバルマブ:d1

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	...	...	...	...	...	28	
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							
イミフィンジ注 生理食塩液	1500 mg/body 250 mL	点滴静注	60分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							





