

静岡県立総合病院 化学療法レジメン（消化器内科・腫瘍内科：食道）

★ レジメンの内容に関するお問い合わせについては、薬剤部 DI 室にお願いします。（平日 13～16 時）

● 最終更新日 2024 年 11 月 27 日

#### ○更新内容

2024 年 11 月 27 日

・食道>6W オプジーボ（3 週毎）/ヤーボイを追加しました。

2022 年 12 月 10 日

消化器内科・腫瘍内科ファイルを臓器別に分けました。

・食道>6W オプジーボ（2 週毎）/ヤーボイを追加しました。

2021 年 12 月 1 日

・食道>2W オプジーボ（240mg/body） ニボルマブ :d1 および胃>2W オプジーボ（240mg/body） ニボルマブ :d1  
を免疫チェックポイント阻害薬 共通レジメンに統一しました。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>3W CDDP/FU(術前妊単 80/800) 1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	...	21			
ソルデム 3A 生理食塩液	1000 mL 1000 mL	点滴静注	翌朝 9:30 まで	●												
アプレピタントカプセル	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	内服	*		●	●	●									
デキサート注 グラネセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL	点滴静注	30 分		●											
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分			●	●	●								
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分						●							
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120 分		●											
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●											
フィジオ 140	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●	●									
フィジオ 140	500 mL	点滴静注	120 分					●	●							
フルオウラシル注 生理食塩液	800 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24 時間		●	●	●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●						

\* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W CDDP/FU(単独, 80/800) 1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	6	7	...	...	28		
ソルデム 3A 生理食塩液	1000 mL 1000 mL	点滴静注	翌朝 9:30 まで	●											
アプレピタントカプセル	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	内服	*		●	●	●								
デキサート注 グラネセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL	点滴静注	30 分		●										
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分			●	●	●							
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分						●						
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120 分		●										
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●										
フィジオ 140	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●	●								
フィジオ 140	500 mL	点滴静注	120 分					●	●						
フルオウラシル注 生理食塩液	800 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24 時間		●	●	●	●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●					

\* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W CDDP/FU(50.4Gy, 75/1000) 1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	6	7	...	...	28		
ソルデム 3A 生理食塩液	1000 mL 1000 mL	点滴静注	翌朝 9:30 まで	●											
アプレピタントカプセル	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	内服	*		●	●	●								
デキサート注 グラネセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL	点滴静注	30 分		●										
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分			●	●	●							
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120 分		●										
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●										
フィジオ 140	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●	●								
フィジオ 140	500 mL	点滴静注	120 分					●							
フルオウラシル注 生理食塩液	1000 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24 時間		●	●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分						●						

\* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W CDDP+FU(60Gy/40Gy, 70/700) 1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	6	7	...	...	28		
ソルデム 3A 生理食塩液	1000 mL 1000 mL	点滴静注	翌朝 9:30 まで	●											
アプレピタントカプセル	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	内服	*		●	●	●								
デキサート注 グラネセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL	点滴静注	30 分		●										
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分			●	●	●							
シスプラチン注 生理食塩液	70 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120 分		●										
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●										
フィジオ 140	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●	●								
フィジオ 140	500 mL	点滴静注	120 分					●							
フルオウラシル注 生理食塩液	700 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24 時間		●	●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分						●						

\* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>JCOG1109>3W CDDP/FU(80/800) 1コースの日数： 21日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	6	7	...	...	21		
ソルデム 3A 生理食塩液	1000 mL 1000 mL	点滴静注	翌朝 9:30 まで	●											
アプレピタントカプセル	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	内服	*		●	●	●								
デキサート注 グラネセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL	点滴静注	30 分		●										
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分			●	●	●							
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30 分						●						
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120 分		●										
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●										
フィジオ 140	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●	●								
フィジオ 140	500 mL	点滴静注	120 分					●	●						
フルオウラシル注 生理食塩液	800 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24 時間		●	●	●	●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●					

\* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>JCOG1109>4W CDDP/FU(41.4Gy, 75/1000) 1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
				1	2	3	4	5	6	7	...	...	28		
ソルデム 3A 生理食塩液	1000 mL 1000 mL	点滴静注	翌朝 9:30 まで	●											
アプレピタントカプセル	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	内服	*		●	●	●								
デキサート注 グラニセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL	点滴静注	30 分		●										
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30 分			●	●	●							
シスプラチン注 生理食塩液	75 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120 分		●										
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●										
フィジオ 140	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●	●								
フィジオ 140	500 mL	点滴静注	120 分					●							
フルオウラシル注 生理食塩液	1000 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24 時間		●	●	●	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分						●						

\* アプレピタントカプセル：Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>5W NED/FU(併用) NED:d1/FU:d1-5

1コースの日数： 35日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	6	...	...	...	35	
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分		●	●								
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30分				●	●						
アクプラ注 生理食塩注	90 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	●										
生理食塩液	1000 mL	点滴静注	180分	●										
フルオウラシル注 生理食塩液	800 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24時間	●	●	●	●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分						●					

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>5W NED/FU(RT 併用) NED:d1/FU:d1-5

1コースの日数： 35日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day										
				1	2	3	4	5	6	...	...	...	35	
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●										
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分		●	●								
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30分				●	●						
アクプラ注 生理食塩注	80 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	●										
生理食塩液	1000 mL	点滴静注	180分	●										
フルオウラシル注 生理食塩液	800 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24時間	●	●	●	●	●						
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分						●					

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道＞4W NED/VDS NED:d1/VDS:d1,8

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day											
				1	2	3	...	8	...	...	...	...	28		
デキサート注 グラニセトロン注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 100 mL	点滴静注	30分	●											
生理食塩液	50mL	点滴静注	15分					●							
フィルデシン注 生理食塩液	3 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5~10分	●				●							
アクプラ注 生理食塩注	90 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	●											
生理食塩液	1000 mL	点滴静注	120分	●											
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分					●							



静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>1W DTX(RT 併用) DTX:d1

1コースの日数： 7日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day							
				1	2	3	4	5	6	7	
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分	●							
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	10 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	60分	●							
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●							

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>4W PTX(70mg/m<sup>2</sup> 3投1休) PTX:d1, 8, 15

1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day									
				1	2	3	...	8	...	15	...	...	28
デキサート注 ファモチジン注 生理食塩液	8.25 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分	●				●		●			
ポララミン注 生理食塩液	5 mg 50 mL	点滴静注	15分	●				●		●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●				●		●			
パクリタキセル注 5%ブドウ糖液	70 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	60分	●				●		●			
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●				●		●			





マンニトール注	500 mL	点滴静注	60 分		●									
フィジオ 140 注	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●	●							
フィジオ 140 注	500 mL	点滴静注	120 分					●	●					
フルオウラシル注	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24 時間		●	●	●	●	●					
生理食塩液	1000 mL													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●		●		

\* アプレピタントカプセル : Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。



フィジオ 140 注	1000 mL	点滴静注	180 分		●	●	●							
フィジオ 140 注	500 mL	点滴静注	120 分					●	●					
フルオウラシル注 生理食塩液	750 mg/m <sup>2</sup> 1000 mL	点滴静注	24 時間		●	●	●	●	●					
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●				

\* アプレピタントカプセル : Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>JCOG1314>4W DCF 1コースの日数： 28日

薬品名	標準的投与量	投与法	投与時間	Day												
				1	2	3	4	5	6	7	...	16	...	28		
ソルデム 3A 生理食塩液	1000 mL 1000 mL	点滴静注	入院時より翌朝 9:30 まで	●												
アフレタクトカブセル	125mg (Day2) 80mg (Day3-4)	内服	*		●	●	●									
デキサート注 グラニセトロン静注 硫酸 Mg 注 生理食塩液	9.9 mg 1 mg 20mEq 100 mL	点滴静注	30分		●											
デキサート注 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分			●	●	●					●			
デキサート注 生理食塩液	3.3 mg 100 mL	点滴静注	30分						●							
ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	30 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	60分		●								●			
シスプラチン注 生理食塩液	80 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	120分		●											
マンニトール注	500 mL	点滴静注	60分		●											
フィジオ 140 注	1000 mL	点滴静注	180分		●	●	●									
フィジオ 140 注	500 mL	点滴静注	120分					●	●							

フルオウラシル注	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24 時間		●	●	●	●	●					
生理食塩液	1000 mL													
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10 分							●		●		

\* アプレピタントカプセル : Day 2 は治療前、 Day 3 ~ 4 は午前中に内服します。

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>6W オプジーボ(2週毎)/ヤーボイ Nivo:d1, 15, 29/Ipi:d1

1コースの日数：42日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
				1	...	...	15	...	...	29	...	...	42
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●			●			
オプジーボ注	240 mg	点滴静注	30分	●			●			●			
生理食塩液	50 mL												
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30分	●									
ヤーボイ注	1 mg/kg	点滴静注	30分	●									
生理食塩液	20 mL												
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●			●			

静岡県立総合病院 化学療法レジメン

レジメン名：食道>6W オプジーボ(3週毎)/ヤーボイ Nivo:d1, 22/Ipi:d1

1コースの日数：42日

薬品名	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day						
				1	...	...	22	...	...	42
生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	●			●			
オプジーボ注	360 mg	点滴静注	30分	●			●			
生理食塩液	50 mL									
生理食塩液	100 mL	点滴静注	30分	●						
ヤーボイ注	1 mg/kg	点滴静注	30分	●						
生理食塩液	20 mL									
生理食塩液	50 mL	点滴静注	5~10分	●			●			